

Mem. Amer. Acad. 6: 412. 1859.—*S. lyi* Lévl. in Rep. Sp. Nov. Fedde 8:171. 1910.

攀援灌木。茎长可达 10 米, 枝条疏生刺或无刺。叶纸质, 椭圆形或卵形, 长 5—17 厘米, 宽 3—11 厘米, 先端微凸, 基部圆形至浅心形, 上面无光泽, 下面淡绿色; 叶柄长 1—1.5 厘米, 约占全长的 1/2—2/5 具狭鞘, 一般有卷须, 脱落点位于上部。圆锥花序长 3—7 厘米, 着生点上方有一枚与叶柄相对的鳞片(先出叶), 通常具 3—7 个伞形花序; 伞形花序具多数花, 总花梗基部有一枚卵形小苞片; 花序托稍膨大, 近球形; 花暗红色; 雄花外花被片长约 5 毫米, 宽约 1.3 毫米, 内花被片宽约 0.5 毫米; 雌花比雄花小, 具 3 枚短的退化雄蕊。浆果直径约 5 毫米, 球形。花期 11 月至次年 2 月, 果期 6—8 月。

产台湾、福建(南部)、广东(海南岛)、广西(南部)、贵州(南部)和云南(南部)。生于海拔 1750 米以下的林中、灌丛下或山坡荫蔽处。也分布于日本、菲律宾、越南和泰国。

本种体态和大果菝葜相近, 但大果菝葜果实直径 1.2—2 厘米, 果梗基部膨大(直径 1.5—2 毫米), 叶表面多少有光泽, 叶柄长 1.5—5 厘米, 圆锥花序具 1—3 个伞形花序, 花绿黄色等特征可以区别。

#### 46. 疣枝菝葜

**Smilax aspericaulis** Wall. ex A. DC., Monogr. Phaner. 1: 195. 1878; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 306. 1892.—*S. verruculosa* Merr. in Philip. Journ. Sci. 5: 173. 1910.—*S. trachyclada* Hay., Icon. Pl. Form. 9: 138, f. 50, 3. 1920.—*S. bracteata* Presl var. *verruculosa* (Merr.) T. Koyama in Quart. Journ. Taiwan Mus. 10: 18. 1957, et 13: 12. 1960.—*S. bracteata* Presl subsp. *verruculosa* (Merr.) T. Koyama in Hara, Fl. East. Himal. 415. 1966.

形态和圆锥菝葜非常相似, 但茎和枝条具疣状突起, 浆果卵球形(即梨形), 顶端锐尖, 紫黑色, 容易鉴别。花期 12 月至次年 2 月, 果期 7—9 月。

产台湾、广东(海南岛)、广西、贵州(南部边界)和云南(东南部)。生于海拔 1900 米以下的林中、灌丛下或山坡荫蔽处。也分布于越南、缅甸、锡金和印度。

#### 47. 银叶菝葜 图版 74: 1—4

**Smilax cocculoides** Warb. in Bot. Jahrb. 29: 257. 1900.—? *S. pinfaensis* Lévl. et Vnt. in Lévl., Liliac. etc. Chine 26. 1905.—*S. polycolea* Warb. var. *acuminata* Warb., l. c.

灌木, 多少攀援, 具粗短的根状茎。茎长 0.5—2 米, 枝条常有不明显的钝稜, 无