

色,主脉5条,支脉疏网状,在两面明显;叶柄长1.5—3厘米,在下部1/4—1/5处有卷须和狭鞘。伞形花序具50—60朵花;总花梗长(4—)5—6毫米;花序托球形;花梗长1—2厘米;雄花:花被筒倒卵形或矩圆形,长约3毫米,宽2毫米,顶端有3枚钝齿;雄蕊约9枚,花丝长约1毫米,短于花药,花药近条形,长约1.5毫米。果实球形稍扁,长5—8毫米,宽6—9毫米。花期4—5月,果期10月。

产我国台湾,海拔约1300米。

2. 短柱肖菝葜 图版 79: 1—2

Heterosmilax yunnanensis Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France **81**: 70. 1934, Jan. — *H. septemneria* Wang et Tang, 中研丛刊 **5**: 428. 1934.

攀援灌木,无毛;小枝有明显的稜。叶纸质或近革质,卵形、卵状心形或卵状披针形,长6—16厘米,宽4.5—15厘米,先端三角状短渐尖,基部心形或近圆形,主脉5—7条,在下面隆起,支脉网状,在两面明显;叶柄长1.5—4厘米,在1/3—1/7处有卷须和狭鞘。伞形花序具20—60朵花;总花梗长(0.5—)1.5—2.5厘米;花序托球形;花梗长1.2—2.5厘米;雄花:花被筒椭圆形,长5—9毫米,宽3—4毫米,顶端有3枚钝齿;雄蕊8—10枚,花丝长3—5毫米,长于花药,基部多少合生成一短的柱状体;花药卵形,长约1.2毫米;雌花:花被筒卵圆形,长3—5毫米,宽3—3.5毫米,顶端有3枚钝齿,约具6枚退化雄蕊;子房卵形。果实近球形,长5—10毫米,宽6—8毫米,紫色。花期5—6月,果期9—11月。

产湖北、四川、贵州、云南、广西、广东。生于山坡密林中、河沟边或路边,海拔700—2400米。


3. 多蕊肖菝葜 图版 79: 4—5

Heterosmilax polyandra Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France **81**: 70. 1934.

攀援灌木,无毛。叶薄纸质,矩圆形,基部心形,长5—13厘米,宽2—7厘米,先端长渐尖,主脉3—5条,支脉密网状,上面更明显;叶柄长0.5—2厘米,近基部有卷须和狭鞘。伞形花序具10—30朵花;总花梗长2—10厘米,稍扁;花梗长10—20毫米;雄花:花被筒近矩圆形,长(5—)7—10毫米,顶端有6齿,其中3齿较小,相间排列;雄蕊9—12枚,长约为花被管的1/3或更短,花丝长约1毫米,花药椭圆形,长约1毫米,合生成一柱状体;雌花一般比雄花稍短,退化雄蕊6,子房卵形。果实球形稍扁,直径约9毫米。花果期11月。

产云南(南部)。生密林中。老挝、缅甸也有分布。果可食。

组2. 肖菝葜组——Sect. *Heterosmilax*——*Oligosmilax* Seem. in Journ. of Bot. **6**:



1—2.短柱肖菝葜 *Heterosmilax yunnanensis* Gagnep., 1.雄株的花枝; 2.雄花, 已切除部分花被。3.台湾肖菝葜 *H. seisiuiensis* (Hay.) Wang et Tang, 雄花, 已切除部分花被。4—5.多蕊肖菝葜 *H. polyandra* Gagnep., 4.雄株的花枝; 5.雄花, 已切除部分花被。(刘春荣绘)