

291, 图 315. 1975; 江苏植物志上册: 387, 图 697. 1977.

多年生草本。茎基部宿存的叶基呈鳞茎状。基生叶质厚, 深绿色, 具光泽, 带状, 长30—50厘米, 宽3—5厘米, 下部渐狭。花茎宽约2厘米; 伞形花序有花10—20朵, 有时更多; 花梗长2.5—5厘米; 花直立向上, 花被宽漏斗形, 鲜红色, 内面略带黄色; 花被管长约5毫米, 外轮花被裂片顶端有微凸头, 内轮顶端微凹, 略长于雄蕊; 花柱长, 稍伸出于花被外。浆果紫红色, 宽卵形。花期为春夏季, 有时冬季也可开花。

原产非洲南部; 我国温室常盆栽供观赏。分株繁殖。

## 2. 垂笑君子兰(拉汉种子植物名称) 君子兰(上海植物名录)

*Clivia nobilis* Lindl. in Bot. Reg. 14: t. 1182. 1828; Herb. Amaryll. 230. 1837; Baker, Handb. Amaryll. 61. 1888; 北京地区植物志(单子叶植物) 291, 图 316. 1975; 江苏植物志上册: 387, 图 698. 1977.

多年生草本。茎基部宿存的叶基呈鳞茎状。基生叶约有十几枚, 质厚, 深绿色, 具光泽, 带状, 长25—40厘米, 宽3—3.5厘米, 边缘粗糙。花茎由叶丛中抽出, 稍短于叶; 伞形花序顶生, 多花, 开花时花稍下垂; 花被狭漏斗形, 桔红色, 内轮花被裂片色较浅; 雄蕊与花被近等长; 花柱长, 稍伸出花被外。花期夏季。

原产非洲南部, 我国引种栽培供观赏。

## 3. 雪片莲属——*Leucojum* L.

L. Sp. Pl. 289. 1753; et Gen. Pl. ed. 5, 140. 1754; Herb. Amaryll. 332. 1837; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3: 720. 1883, sphalm. *Leucoium*; Baker, Handb. Amaryll. 18. 1888; Pax et Hoffm. in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam., ed. 2, 15a: 404. 1930; Traub, Gen. Amaryll. 58. 1963.

鳞茎坚实, 小。基生叶与花茎同时抽出, 叶丝状、线状或宽带状。花茎坚硬中空或纤细实心; 伞形花序有花数朵或有时仅1朵, 下有佛焰苞状总苞, 总苞片1—2, 离生; 花梗纤细; 花白色; 无花被管或有时花被片基部微连合, 花被片彼此相似; 雄蕊着生于花被片基部, 花丝丝状, 花药基着; 子房每室有胚珠多数, 花柱丝状或近顶端呈瘤状, 柱头细小。蒴果3室, 室背开裂; 种子近球形。细胞染色体基数 $x = 7, 8, 9$ 。

本属模式种: 雪片莲 *L. vernum* L.

约12种, 分布于南欧及地中海一带; 我国引种栽培的有1种。

### 1. 夏雪片莲(英拉汉植物名称) 图版1: 1—2

*Leucojum aestivum* L. Syst. Nat. ed. 10, 2: 975. 1759; Herb. Amaryll. 332. 1837; Baker, Handb. Amaryll. 19. 1888; Bailey, Man. Cult. Pl. print. 2, 250. 1954; Backer et Bakh. f. Fl. Java 3: 143. 1968; 江苏植物志上册: 385, 图 694. 1977.