

鳞茎近球形,直径约2.5厘米。秋季出叶,叶带状,长约20厘米,宽约0.8厘米,顶端圆,淡绿色,中间淡色带明显。花茎高约30厘米,淡玫瑰红色;总苞片2枚,披针形,长约3.5厘米,宽约0.5厘米;伞形花序有花5朵;花玫瑰红色;花被裂片倒披针形,长约4厘米,宽约0.8厘米,中度反卷和皱缩,花被筒长约1厘米;雄蕊伸出花被外,比花被长1/6。花期9月。

产江苏、浙江。生于阴湿山坡或石缝中。模式标本采自上海。

6 中国石蒜(江苏植物志上册) 图版5: 4

Lycoris chinensis Traub in Plant Life 14:44. 1958.

鳞茎卵球形,直径约4厘米。春季出叶,叶带状,长约35厘米,宽约2厘米,顶端圆,绿色,中间淡色带明显。花茎高约60厘米;总苞片2枚,倒披针形,长约2.5厘米,宽约0.8厘米,伞形花序有花5—6朵;花黄色,花被裂片背面具淡黄色中肋,倒披针形,长约6厘米,宽约1厘米,强度反卷和皱缩,花被筒长约1.7—2.5厘米,雄蕊与花被近等长或略伸出花被外,花丝黄色;花柱上端玫瑰红色。花期7—8月,果期9月。

产河南、江苏、浙江。野生于山坡阴湿处。模式标本采自南京。

本种与忽地笑 *L. aurea* 极相似,所不同的前者春季抽叶,叶片较短,长约35厘米,宽约2厘米,顶端圆,花被裂片背面具淡黄色中肋,花被筒长1.7—2.5厘米;后者秋季抽叶,长约60厘米,中部最宽处达2.5厘米,基部渐狭,顶端渐尖,花被裂片背面具淡绿色中肋,花被筒长1.2—1.5厘米。

7 广西石蒜 图版6: 1—2

Lycoris guangxiensis Y Hsu et Q. J. Fan, 植物分类学报 20(2). 196. 1982.

鳞茎卵圆形,直径约3厘米。早春出叶,叶狭带状,长24—29厘米,中部最宽处达1—1.2厘米,基部宽约0.4厘米,深绿色,顶端钝,中间淡色带明显。花茎高约50厘米,总苞片2枚,淡棕色,披针形或卵状披针形,长约4厘米,基部最宽处达1.5厘米;伞形花序有花3—6朵,花蕾黄色,具红色条纹,开放时黄色,花被裂片腹面具画笔状红色条纹,倒卵状披针形或倒披针形,长约7厘米,中部最宽处达1.5厘米,顶端急尖,基部具爪,宽约0.5厘米,边缘微皱缩,花被筒长1.5—2厘米,雄蕊与花被近等长,雌蕊伸出花被外。花期7—8月。

产广西。野生阴湿山坡和杂木林中。模式标本采自广西都安。

8 乳白石蒜

Lycoris albiflora Koidz in Bot Mag. Tokyo 38:100 1924; Traub in Plant Life 22:59 1966

鳞茎卵球形,直径约4厘米。春季出叶,叶带状,长约35厘米,宽约1.5厘米,绿色,顶端钝圆,中间淡色带不明显。花茎高约60厘米,总苞片2枚,倒披针形,长约3.5厘米,



1--3.忽地笑 *Lycoris aurea* (L. Her.) Herb 1.鳞茎, 2.花序, 3.叶。 4.中国石蒜 *Lycoris chinensis* Traub. 叶。(史渭清绘)