

鳞茎近球形,直径约 2.5 厘米。秋季出叶,叶带状,长约 20 厘米,宽约 0.8 厘米,顶端圆,淡绿色,中间淡色带明显。花茎高约 30 厘米,淡玫瑰红色;总苞片 2 枚,披针形,长约 3.5 厘米,宽约 0.5 厘米;伞形花序有花 5 朵;花玫瑰红色;花被裂片倒披针形,长约 4 厘米,宽约 0.8 厘米,中度反卷和皱缩,花被筒长约 1 厘米;雄蕊伸出花被外,比花被长 1/6。花期 9 月。

产江苏、浙江。生于阴湿山坡或石缝中。模式标本采自上海。

6 中国石蒜(江苏植物志上册) 图版 5: 4

Lycoris chinensis Traub in Plant Life 14:44. 1958.

鳞茎卵球形,直径约 4 厘米。春季出叶,叶带状,长约 35 厘米,宽约 2 厘米,顶端圆,绿色,中间淡色带明显。花茎高约 60 厘米;总苞片 2 枚,倒披针形,长约 2.5 厘米,宽约 0.8 厘米,伞形花序有花 5—6 朵;花黄色,花被裂片背面具淡黄色中肋,倒披针形,长约 6 厘米,宽约 1 厘米,强度反卷和皱缩,花被筒长约 1.7—2.5 厘米,雄蕊与花被近等长或略伸出花被外,花丝黄色;花柱上端玫瑰红色。花期 7—8 月,果期 9 月。

产河南、江苏、浙江。野生于山坡阴湿处。模式标本采自南京。

本种与忽地笑 *L. aurea* 极相似,所不同的前者春季抽叶,叶片较短,长约 35 厘米,宽约 2 厘米,顶端圆,花被裂片背面具淡黄色中肋,花被筒长 1.7—2.5 厘米;后者秋季抽叶,长约 60 厘米,中部最宽处达 2.5 厘米,基部渐狭,顶端渐尖,花被裂片背面具淡绿色中肋,花被筒长 1.2—1.5 厘米。

7 广西石蒜 图版 6: 1—2

Lycoris guangxiensis Y Hsu et Q. J. Fan, 植物分类学报 20(2). 196. 1982.


鳞茎卵圆形,直径约 3 厘米。早春出叶,叶狭带状,长 24—29 厘米,中部最宽处达 1—1.2 厘米,基部宽约 0.4 厘米,深绿色,顶端钝,中间淡色带明显。花茎高约 50 厘米,总苞片 2 枚,淡棕色,披针形或卵状披针形,长约 4 厘米,基部最宽处达 1.5 厘米;伞形花序有花 3—6 朵,花蕾黄色,具红色条纹,开放时黄色,花被裂片腹面具画笔状红色条纹,倒卵状披针形或倒披针形,长约 7 厘米,中部最宽处达 1.5 厘米,顶端急尖,基部具爪,宽约 0.5 厘米,边缘微皱缩,花被筒长 1.5—2 厘米,雄蕊与花被近等长,雌蕊伸出花被外。花期 7—8 月。

产广西。野生阴湿山坡和杂木林中。模式标本采自广西都安。

8 乳白石蒜

Lycoris albiflora Koidz in Bot Mag. Tokyo 38:100 1924; Traub in Plant Life 22:59 1966

鳞茎卵球形,直径约 4 厘米。春季出叶,叶带状,长约 35 厘米,宽约 1.5 厘米,绿色,顶端钝圆,中间淡色带不明显。花茎高约 60 厘米,总苞片 2 枚,倒披针形,长约 3.5 厘米,



广西石蒜 *Lycoris guangxiensis* Y Hsu et Q J Fan; 1.花序和花, 2.叶。(史渭清绘)