

鳞茎近球形,直径约 2.5 厘米。秋季出叶,叶带状,长约 20 厘米,宽约 0.8 厘米,顶端圆,淡绿色,中间淡色带明显。花茎高约 30 厘米,淡玫瑰红色;总苞片 2 枚,披针形,长约 3.5 厘米,宽约 0.5 厘米;伞形花序有花 5 朵;花玫瑰红色;花被裂片倒披针形,长约 4 厘米,宽约 0.8 厘米,中度反卷和皱缩,花被筒长约 1 厘米;雄蕊伸出花被外,比花被长 1/6。花期 9 月。

产江苏、浙江。生于阴湿山坡或石缝中。模式标本采自上海。

6 中国石蒜(江苏植物志上册) 图版 5: 4

Lycoris chinensis Traub in Plant Life 14:44. 1958.

鳞茎卵球形,直径约 4 厘米。春季出叶,叶带状,长约 35 厘米,宽约 2 厘米,顶端圆,绿色,中间淡色带明显。花茎高约 60 厘米;总苞片 2 枚,倒披针形,长约 2.5 厘米,宽约 0.8 厘米,伞形花序有花 5—6 朵;花黄色,花被裂片背面具淡黄色中肋,倒披针形,长约 6 厘米,宽约 1 厘米,强度反卷和皱缩,花被筒长约 1.7—2.5 厘米,雄蕊与花被近等长或略伸出花被外,花丝黄色;花柱上端玫瑰红色。花期 7—8 月,果期 9 月。

产河南、江苏、浙江。野生于山坡阴湿处。模式标本采自南京。

本种与忽地笑 *L. aurea* 极相似,所不同的前者春季抽叶,叶片较短,长约 35 厘米,宽约 2 厘米,顶端圆,花被裂片背面具淡黄色中肋,花被筒长 1.7—2.5 厘米;后者秋季抽叶,长约 60 厘米,中部最宽处达 2.5 厘米,基部渐狭,顶端渐尖,花被裂片背面具淡绿色中肋,花被筒长 1.2—1.5 厘米。

7 广西石蒜 图版 6: 1—2

Lycoris guangxiensis Y Hsu et Q. J. Fan, 植物分类学报 20(2). 196. 1982.

鳞茎卵圆形,直径约 3 厘米。早春出叶,叶狭带状,长 24—29 厘米,中部最宽处达 1—1.2 厘米,基部宽约 0.4 厘米,深绿色,顶端钝,中间淡色带明显。花茎高约 50 厘米,总苞片 2 枚,淡棕色,披针形或卵状披针形,长约 4 厘米,基部最宽处达 1.5 厘米;伞形花序有花 3—6 朵,花蕾黄色,具红色条纹,开放时黄色,花被裂片腹面具画笔状红色条纹,倒卵状披针形或倒披针形,长约 7 厘米,中部最宽处达 1.5 厘米,顶端急尖,基部具爪,宽约 0.5 厘米,边缘微皱缩,花被筒长 1.5—2 厘米,雄蕊与花被近等长,雌蕊伸出花被外。花期 7—8 月。

产广西。野生阴湿山坡和杂木林中。模式标本采自广西都安。

8 乳白石蒜

Lycoris albiflora Koidz in Bot Mag. Tokyo 38:100 1924; Traub in Plant Life 22:59 1966

鳞茎卵球形,直径约 4 厘米。春季出叶,叶带状,长约 35 厘米,宽约 1.5 厘米,绿色,顶端钝圆,中间淡色带不明显。花茎高约 60 厘米,总苞片 2 枚,倒披针形,长约 3.5 厘米,

宽约 1.2 厘米,伞形花序有花 6—8 朵,花蕾桃红色,开放时奶黄色,渐变为乳白色;花被裂片倒披针形,长约 6 厘米,宽约 1.2 厘米,腹面散生少数粉红色条纹,背面具红色中肋,中度反卷和皱缩,花被筒长约 2 厘米;雄蕊与花被近等长或略伸出,花丝上端淡红色;雌蕊略比花被长,柱头玫瑰红色。花期 8—9 月。

产江苏野生山坡。日本也有分布。模式标本采自日本。

本种花的颜色与短蕊石蒜 *L. caldwellii* 极相似,不同在于后者雄蕊比花被短,雌蕊与花被近等长;花被裂片无粉红色条纹和中肋,仅基部微皱缩。

9 短蕊石蒜

Lycoris caldwellii Traub in Plant Life 13:46 1957.

鳞茎近球形,直径约 4 厘米。早春出叶,叶带状,长约 30 厘米,宽约 1.5 厘米,绿色,顶端钝圆,中间淡色带不明显。伞形花序有花 6—7 朵;花蕾桃红色,开放时乳黄色,渐变成乳白色,花被裂片倒卵状披针形,长约 7 厘米,最宽处达 1.2 厘米,向基部渐狭,微皱缩,花被筒长约 2 厘米,雄蕊短于花被,花丝白色;雌蕊与花被近等长,花柱上端淡玫瑰红色。花期 9 月。

产江苏、浙江、江西。野生阴湿山坡。模式标本采自我国上海。

10 陕西石蒜

Lycoris shaanxiensis Y Hsu et Z. B. Hu, 植物分类学报 20(2): 196, 1982

鳞茎近球形,直径约 5 厘米。早春出叶,叶带状,长约 50 厘米,中部最宽处达 1.8 厘米,基部宽约 0.8 厘米,顶端钝圆,中间淡色带不明显。花茎高约 50 厘米;总苞片 2 枚,淡粉红色,阔披针形或披针形,长 5—7 厘米,基部最宽处达 1.2 厘米;伞形花序有花 5—8 朵;花白色,花被裂片腹面散生少数淡红色条纹,背面具红色中肋,反卷和微皱缩,花被筒长约 2 厘米;雄蕊比花被短,花丝淡紫红色,雌蕊略伸出花被外,花柱顶端紫红色。花期 8—9 月。

产陕西、四川。野生山坡。模式标本采自陕西秦岭南五台山。

11 鹿葱(拉汉种子植物名称) 夏水仙(江苏南部种子植物手册)

Lycoris squamigera Maxim in Bot Jahrb. 6: 79. 1885; Baker, Handb Amaryll 40 1888; Baker in Curtis's Bot. Mag 123: t 7547 1897; Nakai, Fl. Kor 234 1911; Worsley in Gard. Chron ser. 3, 84:169 1928; Traub et Moldenke, Amaryllidac. Tribe Amaryll. 173. 1949; Koyama in Bailaya 7:6. 1959

鳞茎卵形,直径约 5 厘米。秋季出叶,长约 8 厘米,立即枯萎,到第二年早春再抽叶,叶带状,顶端钝圆,绿色,宽约 2 厘米。花茎高约 60 厘米;总苞片 2 枚,披针形,长约 6 厘米,宽约 1.3 厘米;伞形花序有花 4—8 朵;花淡紫红色;花被裂片倒披针形,长约 7 厘米,宽约 1.8 厘米,边缘基部微皱缩,花被筒长约 2 厘米;雄蕊与花被裂片近等长;花柱略伸出