

宽约 1.2 厘米,伞形花序有花 6—8 朵,花蕾桃红色,开放时奶黄色,渐变为乳白色;花被裂片倒披针形,长约 6 厘米,宽约 1.2 厘米,腹面散生少数粉红色条纹,背面具红色中肋,中度反卷和皱缩,花被筒长约 2 厘米;雄蕊与花被近等长或略伸出,花丝上端淡红色;雌蕊略比花被长,柱头玫瑰红色。 花期 8—9 月。

产江苏野生山坡。日本也有分布。模式标本采自日本。

本种花的颜色与短蕊石蒜 *L. caldwellii* 极相似,不同在于后者雄蕊比花被短,雌蕊与花被近等长;花被裂片无粉红色条纹和中肋,仅基部微皱缩。

9 短蕊石蒜

Lycoris caldwellii Traub in Plant Life 13:46 1957.

鳞茎近球形,直径约 4 厘米。早春出叶,叶带状,长约 30 厘米,宽约 1.5 厘米,绿色,顶端钝圆,中间淡色带不明显。伞形花序有花 6—7 朵;花蕾桃红色,开放时乳黄色,渐变成乳白色,花被裂片倒卵状披针形,长约 7 厘米,最宽处达 1.2 厘米,向基部渐狭,微皱缩,花被筒长约 2 厘米,雄蕊短于花被,花丝白色;雌蕊与花被近等长,花柱上端淡玫瑰红色。花期 9 月。

产江苏、浙江、江西。野生阴湿山坡。模式标本采自我国上海。

10 陕西石蒜

Lycoris shaanxiensis Y Hsu et Z. B. Hu, 植物分类学报 20(2): 196, 1982

鳞茎近球形,直径约 5 厘米。早春出叶,叶带状,长约 50 厘米,中部最宽处达 1.8 厘米,基部宽约 0.8 厘米,顶端钝圆,中间淡色带不明显。花茎高约 50 厘米;总苞片 2 枚,淡粉红色,阔披针形或披针形,长 5—7 厘米,基部最宽处达 1.2 厘米;伞形花序有花 5—8 朵;花白色,花被裂片腹面散生少数淡红色条纹,背面具红色中肋,反卷和微皱缩,花被筒长约 2 厘米;雄蕊比花被短,花丝淡紫红色,雌蕊略伸出花被外,花柱顶端紫红色。花期 8—9 月。

产陕西、四川。野生山坡。模式标本采自陕西秦岭南五台山。

11 鹿葱(拉汉种子植物名称) 夏水仙(江苏南部种子植物手册)

Lycoris squamigera Maxim in Bot Jahrb. 6: 79. 1885; Baker, Handb Amaryll 40 1888; Baker in Curtis's Bot. Mag 123: t 7547 1897; Nakai, Fl. Kor 234 1911; Worsley in Gard. Chron ser. 3, 84:169 1928; Traub et Moldenke, Amaryllidac. Tribe Amaryll. 173. 1949; Koyama in Bailaya 7:6. 1959

鳞茎卵形,直径约 5 厘米。秋季出叶,长约 8 厘米,立即枯萎,到第二年早春再抽叶,叶带状,顶端钝圆,绿色,宽约 2 厘米。花茎高约 60 厘米;总苞片 2 枚,披针形,长约 6 厘米,宽约 1.3 厘米;伞形花序有花 4—8 朵;花淡紫红色;花被裂片倒披针形,长约 7 厘米,宽约 1.8 厘米,边缘基部微皱缩,花被筒长约 2 厘米;雄蕊与花被裂片近等长;花柱略伸出