

纹,长约3毫米。 花果期4—11月。

产湖南南部、广东、广西、云南。生于海拔170—1300米的水边、林下、山谷阴湿处。越南、老挝、柬埔寨、泰国、新加坡、马来西亚等地都有分布。模式标本采自马来西亚。

根状茎味苦、性凉,药用有清热解毒、消炎止痛的功效,治刀伤、胃及十二指肠溃疡、肝炎、高血压、胃痛、烧烫伤、疮疡。全株有毒,慎用。


2. 扇苞蒟蒻薯

Tacca subflabellata P. P. Ling et C. T. Ting 植物分类学报 **20**(2):202.

1982. 图 2:1—6.

多年生草本。叶片长圆形或长圆状椭圆形,长35—39厘米,宽13—19厘米,顶端渐尖,基部渐狭,楔形或圆楔形,两侧不相等,几无毛;叶柄长10—29厘米,基部有鞘。花葶长25—30厘米;总苞片4枚,外轮2枚卵状披针形或椭圆形,长4—6厘米,宽3—4厘米,内轮2枚大,近圆扇形,内弯,长约6.5厘米,宽约11.5厘米;小苞片线形,很长;伞形花序;花被管长约0.5厘米,花被裂片6,卵形或狭卵形,2轮,外轮3裂片较内轮3裂片略长,长1—1.5厘米,内轮长约1厘米;雄蕊6,花丝短,顶部为勺状;柱头3深裂,每裂片又分裂为2,花柱短,三棱均呈翅状,与柱头裂片互生。果实、种子未见。本种叶的上表皮细胞边缘为不规则的波浪形,而本属其他种的上表皮细胞边缘为直线形(见图8、9、10)。 花期4—6月。

产云南河口。生于海拔120—160米的山腰湿地。模式标本采自云南河口。



扇苞蒟蒻薯 *T. subflabellata* P. P. Ling et C. T. Ting

图8 波浪形。


9. 丝须蒟蒻薯 *T. integrifolia* Ker-Gawl.10. 箭根薯 *T. chantrieri* André

图 9、10 直线形。

3. 丝须蒟蒻薯 (西双版纳植物名录) 图版 10:6—9

Tacca integrifolia Ker-Gawl. in Curtis's Bot. Mag. **35**:t. 1488. 1812; Hook. f. Fl. Brit Ind. **6**:287. 1894; Limpr. in Engl. Pflanzenr. **92**(4—42):16. 1928; Drenth in Blumae **20**(2):388. 1972. — *Ataccia integrifolia* Presl, Rel. Haenk. **1**(3):149. 1828. — *T. cristata* Jack in Mal. Misc. **1**(5):23. 1821. — *T. laevis* Roxb. Hort. Beng. 25. 1814. nom. nud.

多年生草本。根状茎粗大,近圆柱形。叶片长圆状披针形或长圆状椭圆形,长50—56厘米,宽18.5—21厘米,顶端渐尖,有时尾状,基部渐狭,楔形;叶柄基部有鞘。花葶长约55厘米;总苞片4枚,外轮2枚无柄,狭三角状卵形,内轮2枚质薄,有长柄,匙形,连柄长14—16.5厘米,宽5—6厘米;小苞片线形;花紫黑色,花被管长1—2厘米,花被裂片6,2轮,外轮3片,狭长圆形,长约1.3厘米,宽约0.5厘米,内轮3片,宽倒卵形,长约1.3厘米,宽约1厘米;雄蕊6,花丝短,顶部为勺状,柱头3深裂,每裂片又2裂,花柱极短,略隆起。浆果肉质,长椭圆形,具6棱,长4—5厘米,直径约2厘米,顶端有宿存的花被裂片;种子为不规则的椭圆状卵形,长0.4—0.5毫米。 花果期7—8月。

产我国西藏墨脱。生于海拔800—850米的山坡密林下。马来西亚、泰国、缅甸、巴基斯坦、印度东部等也都有分布。模式标本采自印度东部。

云南西双版纳曾有本种的记载,但未见到标本。

4. 蒟蒻薯 (中国种子植物科属辞典)

Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**:704. 1891; Back.