


9. 丝须蒟蒻薯 *T. integrifolia* Ker-Gawl.10. 箭根薯 *T. chantrieri* André

图 9、10 直线形。

3. 丝须蒟蒻薯(西双版纳植物名录) 图版 10:6—9

Tacca integrifolia Ker-Gawl. in Curtis's Bot. Mag. **35**:t. 1488. 1812; Hook. f. Fl. Brit Ind. **6**:287. 1894; Limpr. in Engl. Pflanzenr. **92**(4—42):16. 1928; Drenth in Blumae **20**(2):388. 1972. — *Ataccia integrifolia* Presl, Rel. Haenk. **1**(3):149. 1828. — *T. cristata* Jack in Mal. Misc. **1**(5):23. 1821. — *T. laevis* Roxb. Hort. Beng. 25. 1814. nom. nud.


多年生草本。根状茎粗大,近圆柱形。叶片长圆状披针形或长圆状椭圆形,长50—56厘米,宽18.5—21厘米,顶端渐尖,有时尾状,基部渐狭,楔形;叶柄基部有鞘。花葶长约55厘米;总苞片4枚,外轮2枚无柄,狭三角状卵形,内轮2枚质薄,有长柄,匙形,连柄长14—16.5厘米,宽5—6厘米;小苞片线形;花紫黑色,花被管长1—2厘米,花被裂片6,2轮,外轮3片,狭长圆形,长约1.3厘米,宽约0.5厘米,内轮3片,宽倒卵形,长约1.3厘米,宽约1厘米;雄蕊6,花丝短,顶部为勺状,柱头3深裂,每裂片又2裂,花柱极短,略隆起。浆果肉质,长椭圆形,具6棱,长4—5厘米,直径约2厘米,顶端有宿存的花被裂片;种子为不规则的椭圆状卵形,长0.4—0.5毫米。 花果期7—8月。

产我国西藏墨脱。生于海拔800—850米的山坡密林下。马来西亚、泰国、缅甸、巴基斯坦、印度东部等也都有分布。模式标本采自印度东部。

云南西双版纳曾有本种的记载,但未见到标本。

4. 蒟蒻薯(中国种子植物科属辞典)

Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 704. 1891; Back.



1--5.箭根薯 *Tacca chantrieri* André: 1.植株的一部分, 2.花, 3.花已剖开, 示雄蕊着生于花被管上, 4.柱头, 5.种子。6--9.丝须药藕薯 *Tacca integrifolia* Ker-Gawl.: 6.苞片, 7.花, 8.花柱, 9.种子。(史渭清绘)