

Handb. Fl. Java 3:107. 1924; Merr. in Journ. Arn. Arb. 26:93. 1945; Parham, Pl. Fiji Isl. 283. 1964. — *Leontice leontopetaloides* Linn. Sp. Pl. 313. 1753. — *T. pinnatifida* G. Forst. Char. Gen. Pl. 69, t. 35. 1776. — *T. involucrata* Schum. et Thenn., Beskr. Guin. Pl. 197. 1827. — *T. gaogao* Blanco Fl. Filip. 262. 1873. — *T. hawaiiensis* Limpr. in Engl. Pflanzenr. 92(4—42):30. 1928.

多年生草本。块茎球形、宽椭圆状球形，外皮幼时白色，老时暗灰色至棕色，里面白色。叶片轮廓宽倒卵形、卵形或长圆卵形，掌状3裂，裂片再作羽状分裂。伞形花序，有花20—40朵；总苞片4—12枚；小苞片线形，长达25厘米；花淡黄色、淡黄绿色或带黑紫绿色；外轮花被裂片椭圆形或卵圆形，长4—7毫米，宽2—3毫米，内轮为宽卵形或长卵圆形，长5—7.5毫米，宽2.5—5毫米。果实下垂，常为球形，有时为椭圆状球形或卵圆状球形；种子多数，扁卵球形，具海绵质的种皮，有条纹。

未见本种标本，根据文献我国台湾有栽培。过去块茎在太平洋地区的岛屿上常为食用，并大量栽培而出售，后发现有毒，才停止食用。本种为广布种，从非洲西部沿海到东太平洋都有分布。原产亚洲热带和非洲。

2. 裂果薯属——*Schizocapsa* Hance

Hance in Journ. Bot. 19:292. 1881.

多年生草本。根状茎近圆柱形，较短。叶全部基生，全缘；叶脉羽状。伞形花序顶生；总苞片4枚，小苞片线形；花被钟状，上部6裂，裂片不相等，脱落；雄蕊6，花丝短，顶部兜状；子房下位，1室，侧膜胎座3，花柱短，柱头5瓣裂。果为蒴果，开裂成三瓣；种子多数，为不规则的长圆形、卵形、半月形。

本属的模式种：裂果薯 *S. plantaginea* Hance

本属现有2种，分布于越南、老挝、泰国等地。我国2种都有。

分种检索表

- 1. 蒴果3瓣裂至基部；内轮花被裂片稍比外轮花被裂片短而宽；叶上表皮细胞无气孔…………… 1. 裂果薯 *S. plantaginea* Hance
- 1. 蒴果3瓣裂至中部；内轮花被裂片比外轮花被裂片小1/2左右；叶上表皮细胞有气孔…………… 2. 广西裂果薯 *S. guangxiensis* P. P. Ling et C. T. Ting

1. 裂果薯(中国高等植物图鉴) 水田七(广西植物名录) 图版12:1—7

Schizocapsa plantaginea Hance in Journ. Bot. 19:292. 1881; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3:741. 1883; Limpr. in Engl. Pflanzenr. 92(4—42):11. 1928; Pax et Hoffm. in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 15a:437. 1930; Gagnep. in Lecte. Fl. Gen.