

低的地方,但在西南山区,海拔 2000—2200 米处也可生长。也产于朝鲜、日本、印度、越南、苏联。模式标本采自印度。

根状茎药用,味苦、性寒、微毒。能清热解毒、散结消炎、消肿止痛、止咳化痰,用于治疗扁桃腺炎及腰痛等症。

9. 肖鸢尾属*——*Moraea* Mill.

Mill. Fig. Pl. 159, t. 238. 27. 1758. (“*Morea*”); corr. Linn. Sp. Pl.

ed. 2, 1: 59. 1762.

多年生草本。地下部分为根状茎或球茎。花被基部不形成花被管,外花被片楔形或狭卵形,顶端反折、平展,内外花被片相似而不等大,有些种类的花被片退化成 3 个尖状体;花丝基部常联合成管状;花柱的分枝扁平,花瓣状,柱头生于花柱顶端裂片的基本部。果实成熟时,胚珠的外珠被变成肉质。

属的模式种:灯心草肖鸢尾 *Moraea juncea* L.

全世界约 100 种,主要产于非洲南部。我国南方常见栽培的有 1 种。

1. 肖鸢尾(广州植物志) 摩利兰 图版 42: 6

Moraea iridioides L. Mant. 1. 28. 1767; Sims in Curtis's Bot. Mag. 19: t. 693. 1804; Bailey, Man. Cult. Pl. 277. 1949; 广州植物志 704. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 571, 图 7971. 1976.

多年生草本。根状茎短粗而肥厚,斜伸。叶基生,扁平,互相套迭,条形,长 30—70 厘米,宽 0.7—1 厘米,基部鞘状,顶端渐尖,质地坚硬,革质,叶脉明显。花茎高 30—90 厘米,上部有 1—2 个分枝,节明显,节上生有披针形抱茎的鞘状叶,叶长 4—7 厘米,顶端钝或突尖;花下的苞片与鞘状叶相似,互生;每花茎分枝的顶端生 2—3 朵花;花白色或略带淡蓝色,直径约 10 厘米;无花被管,花被片 6, 2 轮排列,外花被片倒卵形或宽倒披针形,长 5.5—6 厘米,宽约 3 厘米,顶端钝,爪部楔形,中脉上有鲜黄色氈绒状的附属物,内花被片匙形,长约 5 厘米,宽约 2 厘米,爪部楔形;雄蕊长约 2 厘米,花丝基部联合成筒,包住花柱;花柱上部有 3 个分枝,扁平,披针形,淡蓝色,顶端 2 裂,裂片三角形,边缘有稀疏的牙齿,子房狭倒卵形,基部略细,长约 1.5 厘米。蒴果椭圆形,长 3—4 厘米,直径约 2.5 厘米,顶端无喙,常残留有扁平的花被痕迹。花期 5 月,果期 6—8 月。

原产非洲南部。我国南方常见栽培,供绿化、观赏。

10. 鸢尾属——*Iris* L.

L. Sp. Pl. ed. 1, 38. 1753, et Gen. Pl. ed. 5, 59. 1754; Benth. et

* 属的异名: 摩利兰属



1—5.射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC.: 1.带根状茎植株下部, 2.花枝, 3.雌蕊, 4.果实, 5.开裂的蒴果。6.肖鸢尾 *Moraea iridioides* L.: 带花果枝的植株上部。(于振洲、赵毓棠绘)