

低的地方，但在西南山区，海拔 2000—2200 米处也可生长。也产于朝鲜、日本、印度、越南、苏联。模式标本采自印度。

根状茎药用，味苦、性寒、微毒。能清热解毒、散结消炎、消肿止痛、止咳化痰，用于治疗扁桃腺炎及腰痛等症。

9. 肖鸢尾属* —— *Moraea* Mill.

Mill. Fig. Pl. 159, t. 238. 27. 1758. (“*Morea*”); corr. Linn. Sp. Pl. ed. 2, 1: 59. 1762.

多年生草本。地下部分为根状茎或球茎。花被基部不形成花被管，外花被片楔形或狭卵形，顶端反折、平展，内外花被片相似而不等大，有些种类的花被片退化成 3 个尖状体；花丝基部常联合成管状；花柱的分枝扁平，花瓣状，柱头生于花柱顶端裂片的基部。果实成熟时，胚珠的外珠被变成肉质。

属的模式种：灯心草肖鸢尾 *Moraea juncea* L.

全世界约 100 种，主要产于非洲南部。我国南方常见栽培的有 1 种。

1. 肖鸢尾(广州植物志) 摩利兰 图版 42: 6

Moraea iridioides L. Mant. 1. 28. 1767; Sims in Curtis's Bot. Mag. 19: t. 693. 1804; Bailey, Man. Cult. Pl. 277. 1949; 广州植物志 704. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 571, 图 7971. 1976.

多年生草本。根状茎短粗而肥厚，斜伸。叶基生，扁平，互相套迭，条形，长 30—70 厘米，宽 0.7—1 厘米，基部鞘状，顶端渐尖，质地坚硬，革质，叶脉明显。花茎高 30—90 厘米，上部有 1—2 个分枝，节明显，节上生有披针形抱茎的鞘状叶，叶长 4—7 厘米，顶端钝或突尖；花下的苞片与鞘状叶相似，互生；每花茎分枝的顶端生 2—3 朵花；花白色或略带淡蓝色，直径约 10 厘米；无花被管，花被片 6，2 轮排列，外花被片倒卵形或宽倒披针形，长 5.5—6 厘米，宽约 3 厘米，顶端钝，爪部楔形，中脉上有鲜黄色颤绒状的附属物，内花被片匙形，长约 5 厘米，宽约 2 厘米，爪部楔形；雄蕊长约 2 厘米，花丝基部联合成筒，包住花柱；花柱上部有 3 个分枝，扁平，披针形，淡蓝色，顶端 2 裂，裂片三角形，边缘有稀疏的牙齿，子房狭倒卵形，基部略细，长约 1.5 厘米。蒴果椭圆形，长 3—4 厘米，直径约 2.5 厘米，顶端无喙，常残留有扁平的花被痕迹。 花期 5 月，果期 6—8 月。

原产非洲南部。我国南方常见栽培，供绿化、观赏。

10. 鸢尾属 —— *Iris* L.

L. Sp. Pl. ed. 1, 38. 1753, et Gen. Pl. ed. 5, 59. 1754; Benth. et

* 属的异名：摩利兰属