

产四川、贵州、云南、西藏。生于海拔 1200—4400 米的山坡草地或林缘。模式标本采自四川灌县。

6. 西伯利亚鸢尾(庐山植物园栽培植物手册)

Iris sibirica L. Sp. Pl. 39. 1753; Dykes, Gen. Iris 20, pl. 1. (a). 1913; B. Fedtsch. in Kom. Fl. URSS 4:519. 1935; Bailey, Man. Cult. pl. 275. 1949.

多年生草本,植株基部围有鞘状叶及老叶残留的纤维。根状茎粗壮,斜伸;须根黄白色,绳索状,有皱缩的横纹。叶灰绿色,条形,长 20—40 厘米,宽 0.5—1 厘米,顶端渐尖,无明显的中脉。花茎高于叶片,平滑,高 40—60 厘米,有 1—2 枚茎生叶;苞片 3 枚,膜质,绿色,边缘略带红紫色,狭卵形或披针形,长 4—5.5 厘米,宽 0.8—2 厘米,顶端短渐尖,内包含有 2 朵花;花蓝紫色,直径 7.5—9 厘米;花梗甚短;花被管长约 1 厘米,外花被裂片倒卵形,长 5.5—7 厘米,宽 3.3—5 厘米,上部反折下垂,爪部宽楔形,中央下陷呈沟状,有褐色网纹及黄色斑纹,无附属物,内花被裂片狭椭圆形或倒披针形,长 4.5—5.5 厘米,宽 1.5—1.8 厘米,直立;雄蕊长 3—3.5 厘米,花药紫色,花丝淡紫色;花柱分枝淡蓝色,拱形弯曲,长 4—4.5 厘米,顶端裂片近于半圆形,边缘有不规则的稀疏牙齿,子房绿色,纺锤形,长 1.5—2 厘米。蒴果卵状圆柱形、长圆柱形或椭圆状柱形,长 3.5—5.5 厘米,直径 1.3—1.5 厘米,无喙。花期 4—5 月,果期 6—7 月。

原产欧洲。常栽于庭园及花坛中供观赏。模式标本采自欧洲。

7. 溪荪(本草纲目) 东方鸢尾(中国植物学杂志),西伯利亚鸢尾东方变种(中国东北部植物检索表) 图版 45: 4—6

Iris sanguinea Donn ex Horn. Hort. Bot. Hafn. 1:58. 1813; Bailey, Man. Cult. Pl. 275. 1949; Ohwi, Fl. Jap. 333. 1956. — *I. sanguinea* Donn ex Horn. var. *typica* Makino in Journ. Jap. Bot. 6(11):32. 1930. — *I. nertschinskja* Lodd. in Bot. Catin 19, t.1843. 1832—1833; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 148. 1939; Makino, New Ill. Fl. Jap. 867, t. 3467. 1963. — *I. orientalis* auct. non Mill.: Thunb. in Trans. Linn. Soc. 2:328. 1794; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. 26:519. 1880; Dykes, Gen. Iris 23. 1913; B. Fedtsch. in Kom. Fl. URSS 4:520. 1935; 刘瑛, 中国植物学杂志 3(2): 939. 1936. — *I. sibirica* L. var. *sanguinea* Ker-Gawl. in Curtis's Bot. Mag. t.1604. 1814. — *I. sibirica* L. var. *orientalis* Baker in Journ. Linn. Soc. Bot. 16:139. 1877; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. 26:519. 1880; Kom. Fl. Mansh. 414. 1927. — *I. extremorientalis* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 40:330. 1926; Makino et Nemoto, Fl. Jap. ed.2, 1591. 1931.

多年生草本。根状茎粗壮,斜伸,外包有棕褐色老叶残留的纤维;须根绳索状,灰白色,有皱缩的横纹。叶条形,长 20—60 厘米,宽 0.5—1.3 厘米,顶端渐尖,基部鞘状,中脉不明显。花茎光滑,实心,高 40—60 厘米,具 1—2 枚茎生叶;苞片 3 枚,膜质,绿色,披针形,长 5—7 厘米,宽约 1 厘米,顶端渐尖,内包含有 2 朵花;花天蓝色,直径 6—7 厘米;花