

形,子房纺锤形,长约 1.2 厘米。果实长倒卵形至圆柱形,长 4—7 厘米,直径约 2 厘米,顶端略有短喙,有 6 条明显的肋,新鲜时红褐色,苞片宿存于果实的基部。花期 5—6 月,果期 7—9 月。

产内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、西藏。生于海拔 2000 米以上的高山向阳草地。也产于苏联。模式标本采自苏联西天山。

25. 多斑鸢尾

Iris polysticta Diels in Svensk Bot. Tidskr. 18:428. 1924.

多年生密丛草本,植株基部残留有折断的老叶叶鞘,红棕色。地下为不明显的木质,块状的根状茎。须根淡黄色。叶灰绿色,条形或狭剑形,长 35—70 厘米,宽 4—7 毫米,顶端渐尖,基部鞘状,带红紫色,无明显的中脉。花茎高 30—35 厘米,直径约 7 毫米,黄绿色,有纵棱,有 1—2 枚茎生叶;苞片 3 枚,草质,绿色,边缘膜质,披针形,长 13—20 厘米,宽 1.6—2.5 厘米,顶端渐尖;花黄色,有紫褐色的网状花纹,直径 8—9 厘米;花梗长 7—9 厘米;花被管短而粗,长 3—5 毫米,直径 5—6 毫米,外花被裂片提琴形,长约 6.5 厘米,宽约 1.2 厘米,顶端倒卵形,爪部披针形,内花被裂片倒披针形,长约 4.5 厘米,宽约 8 毫米,直立;花药淡红色,长约 3 厘米;花柱分枝花瓣状,长 3.5—4 厘米,扁平,拱形弯曲,黄色,略带深蓝色的条纹,边缘白色,顶端裂片半圆形。蒴果长 3.5—7 厘米,直径约 1.6 厘米。花期 6—7 月,果期 7—9 月。

产四川、云南、西藏。生于河边湿地及向阳坡地。模式标本采自四川松潘。

据记载:在我国云南一带还有一种草叶鸢尾, *I. farreri* Dykes 营养体特征与本种相似,花灰白色,未见到标本,特附于此,以便进一步探讨研究。

26. 准噶尔鸢尾 图版 51: 5—6

Iris songarica Schrenk in Fisch. et Mey. Enum. Pl. Nov. 1:3. 1841; Ledeb. Fl. Ross. 4:99. 1853; Dykes, Gen. Iris 71. 1913; B. Fedtsch. in Kom. Fl. URSS 4:516. 1945; 刘瑛,中国植物学杂志 3(2): 943. 1936. — *I. songarica* Schrenk var. *gracilis* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. 26:510. 1880.

多年生密丛草本,植株基部围有棕褐色折断的老叶叶鞘。地下生有不明显的木质、块状的根状茎,棕黑色;须根棕褐色,上下近于等粗。叶灰绿色,条形,花期叶较花茎短,长 15—23 厘米,宽 2—3 毫米,果期叶比花茎高,长 70—80 厘米,宽 0.7—1 厘米,有 3—5 条纵脉。花茎高 25—50 厘米,光滑,生有 3—4 枚茎生叶;花下苞片 3 枚,草质,绿色,边缘膜质,颜色较淡,长 7—14 厘米,宽 1.8—2 厘米,顶端短渐尖,内包含有 2 朵花;花梗长 4.5 厘米;花蓝紫色,直径 8—9 厘米;花被管长 5—7 毫米,外花被裂片提琴形,长 5—5.5 厘米,宽约 1 厘米,上部椭圆形或卵圆形,爪部近披针形,内花被裂片倒披针形,长约 3.5 厘米,宽约 5 毫米,直立;雄蕊长约 2.5 厘米,花药褐色;花柱分枝长约 3.5 厘米,宽约 1 厘米,顶端裂片狭三角形,子房纺锤形,长约 2.5 厘米。蒴果三棱状卵圆形,长 4—6.5 厘米,直径