

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。生于干山坡、林缘、路旁及林中旷地，多成片生长。也产于苏联及朝鲜。模式标本采自苏联西伯利亚。

30a. 窄叶单花鸢尾

var. *caricina* Kitagawa in Bot. Mag. Tokyo 49:232, f. 4. 1935.

本变种与原变种区别处在于：本变种植株矮小，高约 10 厘米；叶宽 2—6 毫米。花期 5 月，果期 6—8 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。生于较干旱的草原或山坡上。

组 3. 单苞鸢尾组——Sect. *Ophioiris* Y. T. Zhao, 植物分类学报 18(1): 56. 1980.

31. 单苞鸢尾 避蛇参、春不见(湖北)，蛇不见(浙江)，仇人不见面(广西)，夏无踪(江西) 图版 53: 1—5

Iris anguifuga Y. T. Zhao, ex X. J. xue, 植物分类学报 18(1): 56. 1980.

多年生草本，植株冬季常绿，夏季枯萎，基部围有少量老叶叶鞘的残留纤维。根状茎粗壮，肥厚，斜伸，棕红色或黄褐色，靠近地表处常膨大成球形，黄白色。叶条形，长 20—30 厘米，宽 5—7 毫米，顶端渐尖或短渐尖，基部鞘状，有 3—6 条纵脉。花茎高 30—50 厘米，具 4—5 枚茎生叶，叶狭披针形，长 8—12 厘米，宽约 5 毫米；苞片 1 枚，草质，狭披针形，长 10—13.5 厘米，宽约 8 毫米，顶端渐尖，与上部的茎生叶相似，苞片内只有 1 朵花；花蓝紫色，直径约 10 厘米；花梗长 2.5 厘米；花被管细，长约 3 厘米，上部略膨大，外花被裂片倒披针形，长 5—5.5 厘米，宽约 8 毫米，有褐色的条纹及斑点，顶端微凹，爪部狭而长，内花被裂片狭倒披针形，长 4.5—5 厘米，宽约 3 毫米，有蓝褐色的条纹；雄蕊长约 2.5 厘米，花药鲜黄色，较花丝长，花丝扁平，与花药等宽；花柱扁平，长 4.5—5 厘米，宽约 6 毫米，呈拱形弯曲，顶端的裂片细长，狭三角形。蒴果三棱状纺锤形，长 5.5—7 厘米，直径 1.5—2 厘米，外被稀疏的黄褐色柔毛，顶端有长喙，果梗长约 5 厘米；种子圆球形，直径 4—5 毫米。

花期 3 月末 4 月初，开花时间约 1 周，果期 5—7 月。

产安徽、湖北、广西。生于山坡草地。浙江、江西、贵州等地常见栽培。模式标本采自中国科学院武汉植物研究所药草园的栽培植物，原产于湖北咸宁。

民间用其根状茎治疗毒蛇咬伤，疗效显著，又内服能润肠、通便、致泻。

亚属 2. 琴瓣鸢尾亚属——Subgen. *Xyridion* (Tausch) Spach in Ann. Sci. Nat. sér. 3, 5:94. 1846; em. Rodion. Род Ирис-Iris L. 191. 1961. ——*Iris* Sect. *Xyridion* Tausch in Schultes, Additam. Mantis. 2:370. 1824, p. p.

组 1. 琴瓣鸢尾组——Sect. *Xyridion* Tausch in Hort. Canalius, 1.1823.

32. 喜盐鸢尾(乌鲁木齐植物检索表) 厚叶马蔺(新疆) 图版 53: 6—7



1—5.单苞鸢尾 *Iris anguifuga* Y. T. Zhao: ex X. J. xue: 1.植株, 2.根状茎, 3.花柱分枝, 4.雄蕊, 5.果枝。6—7.喜盐鸢尾 *Iris halophila* Pall.: 6.带根状茎植株, 7.果枝。(于振洲、赵毓棠绘)