

米。 花期 4 月,果期 5—8 月。

产云南、西藏。生于海拔 2000 米左右的林缘草地或河边湿地。也产于印度及不丹。模式标本采自印度东北部的曼尼普尔。

本种常与扁竹兰 *I. confusa* 相混淆,其不同点在于本种的花大,直径 7.5—8 厘米,后者花较小,直径 5—5.5 厘米。另外 Hook. f. 在印度植物志中称本种的外花被裂片上无须毛及鸡冠状的附属物,这个描述是根据 Baker 的手稿记载,可能是由于观察疏忽所致,在此加以说明。

42. 宽柱鸢尾 图版 56:5—6

Iris latistyla Y. T. Zhao, 植物分类学报 18(1):61. 1980.

多年生草本,植株基部围有棕褐色或灰褐色的老叶残留纤维。根状茎甚短,不明显;根肉质、肥厚,淡棕色,有皱缩的横纹。叶基生,灰绿色,狭条形,长 15—25 厘米,宽 2—3 毫米,有 2—3 条纵脉,顶端长渐尖,基部鞘状。花茎高 6—14 厘米,直径约 2 毫米,不分枝或有 1 侧枝。苞片 3 枚,草质,绿色,狭披针形,长 2.5—4.5 厘米,宽 6—8 毫米,顶端渐尖,内包含有 2 朵花;花蓝紫色,直径约 5 厘米;外花被裂片倒卵形,长 3.5—4 厘米,宽约 1.5 厘米,自中部向下反折,爪部楔形,有蓝白相间的条纹,中脉上的鸡冠状附属物成不整齐的缝状细裂,内花被裂片宽披针形,或狭卵形,长约 3.5 厘米,宽约 1.5 厘米;花柱分枝扁而宽,长约 4 厘米,宽约 1.5 厘米,顶端裂片宽而大,三角形,集中于花中央,边缘有疏齿。

花期 5—6 月,果期 7—9 月。

产我国西藏。生于林缘、灌丛或田边草地,海拔 3100—4000 米处。模式标本采自西藏林芝县尼西。

43. 鸢尾(神农本草经) 屋顶鸢尾(中国植物学杂志),蓝蝴蝶(广州),紫蝴蝶、扁竹花(陕西),蛤蟆七(湖北) 图版 58: 1—3

Iris tectorum Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. 15: 380. 1871; Hook. f. in Curtis's Bot. Mag. t. 6118. 1874; Baker in Gard. Chron. ser. 2, 6:37. 1876; Dykes, Gen. Iris 102, pl. 24(a) 1913; 刘瑛,中国植物学杂志 3(2): 937. 1936; Ohwi, Fl. Jap. 333. 1956; 中国高等植物图鉴 5: 573, 图 7975. 1976; 秦岭植物志 1(1): 386. 1976. — *I. rosthornii* Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29:261. 1910. — *I. chinensis* Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. Coll. 64. 1833. non Curtis. 1797.

多年生草本,植株基部围有老叶残留的膜质叶鞘及纤维。根状茎粗壮,二歧分枝,直径约 1 厘米,斜伸;须根较细而短。叶基生,黄绿色,稍弯曲,中部略宽,宽剑形,长 15—50 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,顶端渐尖或短渐尖,基部鞘状,有数条不明显的纵脉。花茎光滑,高 20—40 厘米,顶部常有 1—2 个短侧枝,中、下部有 1—2 枚茎生叶;苞片 2—3 枚,绿色,草质,边缘膜质,色淡,披针形或长卵圆形,长 5—7.5 厘米,宽 2—2.5 厘米,顶端渐尖或长渐尖,内包含有 1—2 朵花;花蓝紫色,直径约 10 厘米;花梗甚短;花被管细长,长约 3 厘



1—4. 小花鸢尾 *Iris speculatrix* Hance: 1. 植株, 2. 外花被裂片, 3. 果枝, 4. 种子。 5—6. 宽柱鸢尾 *Iris latistyla* Y. T. Zhao: 5. 带根状茎及根的植株下部, 6. 花枝。(张春方、于振洲绘)