

有一小尖头。果丛共 8 段,每段有果 2 列,约 15—16 个。浆果倒卵形,长约 13 厘米,直径 4 厘米,灰绿色,棱角明显,先端收缩成一具棱角、长约 2 厘米的柱状体,基部渐狭成长 2.5 厘米的柄,果内具多数种子;种子扁球形,褐色,具疣。

产云南西部、广西、广东,生于沟谷坡地的湿润常绿林中。亚洲南部、东南部均有分布。

假茎可作猪饲料。本种是目前世界上栽培香蕉的亲本种之一。

2. 小果野蕉(云南) 阿加蕉(云南景颇语);木桂根雷(云南傣语)

*Musa acuminata* Colla, Men. Gen. Musa 66. 1820; Cheesm. in Kew Bull. 1948: 17. 1948.

假茎高约 4.8 米,油绿色,带黑斑,被有蜡粉。叶片长圆形,长 1.9—2.3 米,宽 50—70 厘米,基部耳形,不对称,叶面绿色,被蜡粉,叶背黄绿色,无蜡粉或被蜡粉,中脉上面绿色,下面白黄色;叶柄长约 0.8 米,被蜡粉,叶翼张开约 0.6 厘米。雄花合生花被片先端 3 裂,中裂片两侧有小裂片,二侧裂片先端具钩,钩上有毛,离生花被片长不及合生花被片之半,先端微凹,凹陷处具小尖突。果序长 1.2 米,总梗长达 0.7 米,直径 4 厘米,被白色刚毛。浆果圆柱形,长约 9 厘米,内弯,绿色或黄绿色,被白色刚毛,具 5 棱角,先端收缩而延成长 0.6 厘米的喙,基部弯,下延成长不及 1 厘米的柄,果内具多数种子;种子褐色,不规则多棱形,直径 5—6 毫米,高 3 毫米。

产云南东南部至西部及广西西部;适应性强,分布广,多生于阴湿的沟谷、沼泽、半沼泽及坡地上;海拔 1,200 米以下。印度北部,缅甸,泰国,越南,经马来西亚至菲律宾也有分布。

假茎可作猪饲料。本种是目前世界上栽培香蕉的亲本种之一。

3. 香蕉(通称) 龙溪蕉、天宝蕉(福建),芎蕉(广东潮汕),矮脚盾地雷、中脚盾地雷、矮把蕉、高把蕉、高脚牙蕉、油蕉、梅花蕉(广东),矮脚香蕉、开远香蕉、高脚香蕉(云南),桂母息(云南德宏州傣语),桂衣店、桂尖(云南西双版纳州傣语),中国矮蕉(国外统称) 图版 3: 1—2

*Musa nana* Lour., Fl. Cochinch. 644. 1790.—*M. cavendishii* Lamb. in Paxt. Mag. Bot. 3: 51. 1837, cum Icone.—*M. sinensis* Sagot ex Bak. in Ann. Bot. 7: 209. 1893.

植株丛生,具匍匐茎,矮型的高 3.5 米以下,一般高不及 2 米,高型的高 4—5 米,假茎均浓绿而带黑斑,被白粉,尤以上部为多。叶片长圆形,长 (1.5) 2—2.2(2.5) 米,宽 60—70(85) 厘米,先端钝圆,基部近圆形,两侧对称,叶面深绿色,无白粉,叶背浅绿色,被白粉;叶柄短粗,通常长在 30 厘米以下,叶翼显著,张开,边缘褐红色或鲜红色。穗状花序下垂,花序轴密被褐色绒毛,苞片外面紫红色,被白粉,内面深红色,但基部略淡,具光泽,雄花苞片不脱落,每苞片内有花 2 列。花乳白色或略带浅紫色,离生花被片近圆形,全缘,先