

我国广东、广西、云南及台湾等省区有栽培；原产菲律宾。

假茎富含纤维，属硬质纤维，拉力强，多用于制作绳缆。

本种叶翼近膜质，紧密闭合，有细而密的皱折，边缘膜质，极易识别。

10. 红蕉(广州植物志) 芭蕉红(云南金平)，指天蕉(云南河口)

Musa coccinea Andr., Repository t. 47. 1799.—*M. uranoscopos* Lour.,

Fl. Cochinch. 645. 1793. non Rumph.

假茎高1—2米。叶片长圆形，长1.8—2.2米，宽68—80厘米，叶面黄绿色，叶背淡黄绿色，无白粉，基部显著不相等，浑圆而无耳；叶柄长30—50厘米，有张开的窄翼。花序直立，序轴无毛，苞片外面鲜红而美丽，内面粉红色，皱折明显，每一苞片内有花一列，约6朵；雄花花被片乳黄色，合生花被片具5(3+2)齿裂，二侧裂片具角，离生花被片先端尖且具细齿，与合生花被片几等长。浆果果身直，在序轴上斜向下垂，灰白色，无棱，长10—12厘米，直径约4厘米，果柄长3—3.5厘米，果内种子极多。

产云南东南部(河口、金平一带)；散生于海拔600米以下的沟谷及水分条件良好的山坡上；广东、广西常栽培。越南亦有分布。

植株细瘦，花苞殷红如炬，十分美丽，可作庭园布置用绿化材料。果实、花、嫩心及根头有毒，不能食用。

2. 鹤望兰亚科——STRELITZOIDEAE K. SCHUM.

K. Schum. in Engl. Pflanzenr. IV. 45: 13. 1900; Winkler
in Engl. Nat. Pflanzenfam. 15a: 538. 1930.

茎干高大或无；叶、苞片二行排列；花两性，两侧对称，排成蝎尾状聚伞花序，生于一大型佛焰苞中；花萼3，花瓣3，发育雄蕊5—6；子房下位，3室，每室有胚珠1—多颗。蒴果，开裂为3瓣或不裂。

4属，87种，产热带美洲及非洲南部、马达加斯加。我国全为引种，有3属，5种。

4. 旅人蕉属——*Ravenala* Adans.

Adans., Fam. Pl. 2: 67. 1763; Winkler in Engl. Pflanzenfam. 15a: 532. p. p.; H. Perr. in Humb. Fl. Madagascar 46e, 4. 1946; Bailey, Man. Cult. Pl. 288. 1949. p. p.

乔木状。叶2列于茎顶，呈折扇状；叶柄长，具鞘。花序腋生，较叶柄为短，由10—12个呈二行排列于花序轴上的佛焰苞所组成，佛焰苞大型，舟状，内有花数至10余朵；花两性，白色，在佛焰苞内排成蝎尾状聚伞花序；萼片3，相等，分离；花瓣3，侧生的2枚与萼片相似，中央的1枚稍较短且狭；雄蕊6枚，花药线形，远较花丝为长；子房3室，胚珠多