

米,橙黄色,箭头状花瓣基部具耳状裂片,和萼片近等长,暗蓝色;雄蕊与花瓣等长;花药狭线形,花柱突出,柱头3。花期:冬。

我国南方大城市的公园、花园有栽培,北方则为温室栽培。原产非洲南部。

花奇特,多盆栽供观赏。

2. 大鹤望兰(新拟) 图版5

Strelitzia nicolai Regel & Koern. in Gartenfl. 7: 265, t. 235. 1858; Wright in Thiselton-Dyer, Fl. Capensis 5: 318. 1913; Hook. f. in Curtis' Bot. Mag. t. 7038; 正宗严敬,最新台湾总目录 279. 1936 Moore & Hyppio in Baileya 17: 72. 1970.

茎干高达8米,木质。叶片长圆形,长90—120厘米,宽45—60厘米,基部圆形,不等侧;叶柄长1.8米。花序腋生,总花梗较叶柄为短,花序上通常有2个大型佛焰苞,佛焰苞绿色而染红棕色,舟状,长25—32厘米,顶端渐尖,内有花4—9朵,花梗长2—3厘米;萼片披针形,白色,长13—17厘米,宽约1.5—3厘米,下方的1枚背具龙骨状脊突,箭头状花瓣天蓝色,长10—12厘米,中部稍收狭,基部戟形,中央的花瓣极小,长圆形,长6—10毫米;雄蕊5枚,线形,长约5厘米;花柱线形,长16—20厘米,柱头3裂。

我国台湾、广东有引种;原产非洲南部。栽培供观赏。

3. 扇芭蕉(台湾木本植物志)

Strelitzia alba (L. f.) H. C. Skeels, U. S. D. A. Bureau Pl. Ind. Bull. 248. 57. 1912; Moore & Hyppio, Baileya 17: 72, fig. 2. 1970.——*Heliconia alba* L. f., Suppl. Pl. 157. 1781.——*Strelitzia augusta* Thunb., Nov. Gen. Pl. 113. 1792; Curtis' Bot. Mag. t. 4167, 4168. 1845.

干高达6米,直径15—20厘米;有叶落后残留之环状疤痕。叶2列于茎顶,外观似旅人蕉,叶片长圆形,长60—90厘米,顶端急尖,基部心形,具明显的平行侧脉,叶柄长1.2—1.8米,基部具槽。花序自下部叶腋内生出,一个花序只有一个佛焰苞;苞片披针形,棕色,略染黄;佛焰苞阔披针形,对折,深紫色,内贮水液。每一苞片内有花数朵,具短花梗,花的一般构造和鹤望兰相似,但花之各部全为白色;箭头状花瓣边缘略弯曲,上部微呈波状,下部抱持,基部圆形;种子有一簇由黄变红的毛。

我国台湾有引种,供观赏。原产南美洲。

6. 蝎尾蕉属*——*Heliconia* L. nom. cos.**

L., Mant. 2: 147. 1771; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 1 (IV 45): 33. 1900; Winkler in Engl. Nat. Pflanzenfam. 15a: 536.

* 新拟,旧译名海里康属。

** 参见 Aristeguieta, El Genero *Heliconia* in Venezuela 1962.