

裂，质厚，密被短柔毛。穗状花序长7—9厘米，花序轴疏被短柔毛，无总花梗；总苞片2枚，卵状披针形，长4.5—13厘米，和苞片、小苞片二面同被绢质长柔毛；苞片卵状三角形，红色，长2.4—3厘米，每一苞片内有花3朵；小苞片卵状三角形，长1.5—1.8厘米；花萼淡红色，长约1厘米，外密被贴伏的绢毛，2齿裂，一侧浅裂；花冠管长约2厘米，外被柔毛，裂片长圆形，长约1厘米，宽约4毫米，后方的一枚较大，外密被贴伏的绢毛；侧生退化雄蕊近锥状，长约2毫米，密被短腺毛；唇瓣卵圆形，宽约7毫米，具红色条纹，顶端2裂；雄蕊长约9毫米，花药长4毫米，花丝和花药隔壁被短腺毛；子房无毛。蒴果近球形，直径约8毫米，顶端具残存的花萼管。花期：6—7月。

产广西；生于山坡林下，海拔1400—1500米。模式标本采自靖西。

14. 香姜(植物分类学报)

Alpinia coriandriodora D. Fang, 植物分类学报 16 (4): 79. 1978.

茎丛生，高0.5—2米，粗5—8毫米；根茎短，紫红色。叶15—26片，叶片椭圆状披针形，长8—33厘米，宽1.2—5厘米，顶端渐尖，长尾状，通常早枯，基部楔形，下延，两面无毛，边缘具脱落性的短刚毛，几无柄；叶舌长3—8毫米，2浅裂，通常被缘毛。穗状花序长5—10厘米，花序轴密被短柔毛；总苞片椭圆状披针形，长4.5—12厘米，被微柔毛，顶端尾状；苞片与总苞片相似，长1.5—5厘米，宽4—6毫米，早落；小苞片椭圆形，扁平，长5—9毫米，被微柔毛，脱落性，花序下部的花3朵聚生，上部的单生；花梗长约1毫米，密被短柔毛；花萼长6—9毫米，3齿裂，一侧浅裂，密生微柔毛；花冠管与花萼近等长，裂片长圆形，长约7毫米，宽4毫米，外密被贴伏的短柔毛；唇瓣近卵圆形，直径6—7毫米，具紫红色条纹，顶端2浅裂，两面有柔毛；侧生退化雄蕊线形，长约4毫米，被短腺毛；雄蕊长约1.1厘米，药隔附属体舌状或三角形，长2毫米；子房密被短柔毛。蒴果球形，直径0.8—1.4厘米，成熟时红色，被疏短毛，顶端具宿存的花被管。花期：4—5月；果期：9—10月。

产广西(龙州、南宁)。模式标本采自南宁。

植株具“芫荽”样香味，民间常栽培作调味香料，并用于驱风行气。

15. 球穗山姜(植物分类学报) 图版25: 5—6

Alpinia strobiliformis T. L. Wu & Senjen, 植物分类学报 16 (3): 33. 图7. 1978.

株高0.8—1.2米。叶片线形，长25—50厘米，宽2.5—5厘米，顶端具尾状细尖头，基部渐狭，叶背密生茸毛；叶柄从近于无到长1厘米；叶舌2裂，裂片圆形，长1—3毫米。穗状花序顶生，紧密，呈球果状，长4.5厘米，宽3厘米；苞片卵形，长1.7—2.2厘米，宽1—1.5厘米，两面均密被长柔毛，干时淡棕色，覆瓦状排列；小苞片卵形，长约1.2厘米，外被金色绢毛；花白色；花萼筒状，长1厘米，顶端2齿裂，具缘毛；花冠管长1.1厘米，花冠裂片卵形，长7毫米，宽3毫米；唇瓣长圆形，与花冠裂片近等长，顶端2裂，无侧生退化