

产我国台湾。模式标本采自台湾。

#### 6. 多穗姜(新拟)

**Zingiber pleiostachyum** K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 185. 1904.

纤细草本，株高 50 厘米。叶片长圆形或长圆状披针形，长 9—15 厘米，宽 3—4.5 厘米，两面均无毛；叶柄长 3—6 毫米；叶舌 2 裂，长 6 毫米，无毛。花序很多，总花梗长 4—7 厘米，呈“之”字形，无毛，上有 5—6 枚长圆状披针形的鞘；穗状花序有花 4—6 朵；苞片线状披针形，长 3 厘米，无毛；小苞片旋卷；花红色，有长 6—7 毫米、被绢毛的小花梗；花萼长 1.8 厘米，一侧开裂；花冠管极纤细，长 3.8 厘米，裂片长约 2 厘米；唇瓣近菱形，长约 2.4 厘米，侧裂片长 6 毫米，稍锐尖；花药与药隔附属体各长 1.1 厘米。

产我国台湾。模式标本采自台湾。

据原著者称，本种苞片极狭，花有被绢毛的小花梗，极易与近缘种区别。

#### 7. 红冠姜(新拟)

**Zingiber roseum** (Roxb.) Rosc. in Trans. Linn. Soc. 8: 348. 1807; Bak. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 244. 1892; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20(IV. 46): 184. 1904.——*Amomum roseum* Roxb., Corom., Pl. t. 126. 1798.

株高达 1.5 米。叶片长圆形或长圆状披针形，长约 30 厘米，宽 3—5 厘米，叶面无毛，叶背被长柔毛，无柄；叶舌膜质，2 裂，长达 3.5 厘米。总花梗极短，穗状花序稠密，头状，长达 6 厘米；苞片红色，外面的阔卵形，里面的卵状披针形，长 3.5—4.5 厘米；花萼绿色，长 1.5 厘米；花冠管白色，长 2 厘米，裂片披针形，淡红色；唇瓣长圆状楔形，略较花冠裂片为短，白色，边缘卷曲、皱褶；侧裂片极短，圆形，黄色；雄蕊弯拱形，药隔附属体与花药等长。花期：秋。

产云南西南部(德宏自治州)；生于疏林中潮湿之处，海拔 940 米。印度也有分布。

本种叶舌极长，很容易和近缘种区别开来。

#### 8. 匙苞姜(植物分类学报)

**Zingiber cochleariforme** D. Fang, 植物分类学报 18: 225. 1980.

根茎肥厚，块状，淡黄色，具辛辣味，常有块根。株高 0.7—2 米；叶片椭圆状披针形，稀近长圆形，长 35—48 厘米，宽 8—14 厘米，顶端渐尖，基部楔形至圆楔形，叶面无毛，密被紫褐色腺点，叶背疏被贴伏的长柔毛和腺点；无柄或具长 4—6 毫米的短柄，被长柔毛；叶舌 2 深裂至 2 全裂，长 4—7(14) 毫米，膜质，无毛或被疏毛。穗状花序卵形至倒卵形，长 3—6 厘米，宽 1.5—5 厘米；总花梗长 1—6 厘米，柔弱，被长柔毛；苞片紫色或白色，楔状匙形至长圆形，顶端截平或圆形，长 1.5—4 厘米，宽 0.5—2 厘米，外被柔毛；小苞片一侧开裂至基部，长 2.2—2.8 厘米；花无梗；花萼淡黄色，长 1—1.3 厘米，一侧浅裂；花冠管长 3.5—4 厘米，裂片披针形，黄白色，长约 2.5 厘米，宽约 5 毫米；唇瓣黄白色，长约

2.5 厘米,中裂片倒披针形,长 2 厘米,宽 8 毫米,顶端紫色或红色,通常具 3 枚小齿,两側裂片近长圆形,长 9 毫米,宽 5 毫米,喉部有短毛;花药和药隔附属体各长 1.2 厘米,附属体通常紫色或红色,稀黄色;子房密被贴伏的长柔毛。蒴果成熟时红色,卵状椭圆形,长 4 厘米,宽 2 厘米,具钝三棱,被疏毛;种子红色,外被白色假种皮。花期:8—10 月;果期:10—11 月。

产广西。模式标本采自隆林。

#### 9. 桂姜(植物分类学报)

**Zingiber kwangsiense** D. Fang, 植物分类学报 18: 226.1980.

株高 0.5—1.5 米;根茎肥厚,块状,粗 1—3 厘米,有块根。叶片长圆状披针形或披针形,长 25—34 厘米,宽 5—9 厘米,顶端渐尖,基部圆楔形至楔形,叶面密被紫褐色腺点,叶背疏被贴伏的长柔毛和紫褐色腺点;叶柄短,长 1—4 毫米;叶舌膜质,长 2—6 毫米,顶端微凹,具微毛。穗状花序倒卵形,长 4—8 厘米,宽 2—4 厘米,有花达 30 余朵;总花梗长 2.5—20 厘米,柔弱;苞片红色或紫色,稀绿色,长圆状披针形,长 4—5 厘米,宽 1—1.5 厘米,外疏被柔毛;花萼长 0.9—1.8 厘米,外疏被伏毛;花冠管长约 4.5 厘米,无毛,裂片线形,长 3.5—4 厘米,宽 5 毫米,外面疏被伏毛,顶端红色;唇瓣全长 3 厘米,淡黄色,中裂片长圆形,长约 2 厘米,宽约 7 毫米,顶端 2 齿裂,稀全缘,侧裂片近长圆形,长约 1 厘米,宽约 5 毫米;花药长 1.4 厘米,附属体长 1.8 厘米,红色;子房密被长伏毛,长 5 毫米。蒴果卵形,具三钝棱,长 3—4 厘米,宽 1—1.5 厘米,被毛;种子红色,外被白色假种皮。花期:9—10 月;果期:10—11 月。

产广西;生于山坡林下。模式标本采自博白。

#### 10. 乌姜(广西凌云)

**Zingiber linyunense** D. Fang, 植物分类学报 18: 226.1980.

根茎肥厚,块状,外面白色,内面紫蓝色,味淡微甜,通常有块根。株高 0.5—1.7 米。叶片狭披针形,长 15—27 厘米,宽 1.8—3.5 厘米,顶端渐尖,基部圆楔形,叶面无毛,密被紫褐色腺点,叶背疏被贴伏的长柔毛;叶柄长 1—5 毫米;叶舌 2 全裂,长 1—5 毫米,无毛或有毛。穗状花序卵形至卵状椭圆形,长 3—5.5 厘米,直径 1—3 厘米;总花梗纤细,长达 24 厘米;鳞片紫色,长圆形至倒披针形,长 1—4.5 厘米;苞片紫红色,长椭圆形至长圆状倒披针形,长 2.5—4 厘米,宽 0.6—1.4 厘米,外面被毛;花白色,无梗;花萼长 1.1—1.4 厘米,顶端 2—3 齿裂,基部被毛;花冠管长约 2.5 厘米,有毛,裂片披针形,长 1.5—2 厘米,宽 5 毫米;唇瓣全长 2 厘米,中裂片倒卵形,长 1 厘米,宽 1.2 厘米,顶端圆或微凹,两侧裂片小,长约 3 毫米;花药和附属体各长 1 厘米;子房密被长柔毛。花期:8—9 月;果期:10—11 月。

产广西,生于林下石上。模式标本采自凌云。

#### 11. 囊荷(名医别录) 野姜(江西) 图版 51: 1—5