

2.5 厘米,中裂片倒披针形,长 2 厘米,宽 8 毫米,顶端紫色或红色,通常具 3 枚小齿,两侧裂片近长圆形,长 9 毫米,宽 5 毫米,喉部有短毛;花药和药隔附属体各长 1.2 厘米,附属体通常紫色或红色,稀黄色;子房密被贴伏的长柔毛。蒴果成熟时红色,卵状椭圆形,长 4 厘米,宽 2 厘米,具钝三棱,被疏毛;种子红色,外被白色假种皮。花期:8—10 月;果期:10—11 月。

产广西。模式标本采自隆林。

9. 桂姜(植物分类学报)

Zingiber kwangsiense D. Fang, 植物分类学报 18: 226.1980.

株高 0.5—1.5 米;根茎肥厚,块状,粗 1—3 厘米,有块根。叶片长圆状披针形或披针形,长 25—34 厘米,宽 5—9 厘米,顶端渐尖,基部圆楔形至楔形,叶面密被紫褐色腺点,叶背疏被贴伏的长柔毛和紫褐色腺点;叶柄短,长 1—4 毫米;叶舌膜质,长 2—6 毫米,顶端微凹,具微毛。穗状花序倒卵形,长 4—8 厘米,宽 2—4 厘米,有花达 30 余朵;总花梗长 2.5—20 厘米,柔弱;苞片红色或紫色,稀绿色,长圆状披针形,长 4—5 厘米,宽 1—1.5 厘米,外疏被柔毛;花萼长 0.9—1.8 厘米,外疏被伏毛;花冠管长约 4.5 厘米,无毛,裂片线形,长 3.5—4 厘米,宽 5 毫米,外面疏被伏毛,顶端红色;唇瓣全长 3 厘米,淡黄色,中裂片长圆形,长约 2 厘米,宽约 7 毫米,顶端 2 齿裂,稀全缘,侧裂片近长圆形,长约 1 厘米,宽约 5 毫米;花药长 1.4 厘米,附属体长 1.8 厘米,红色;子房密被长伏毛,长 5 毫米。蒴果卵形,具三钝棱,长 3—4 厘米,宽 1—1.5 厘米,被毛;种子红色,外被白色假种皮。花期:9—10 月;果期:10—11 月。

产广西;生于山坡林下。模式标本采自博白。

10. 乌姜(广西凌云)

Zingiber linyunense D. Fang, 植物分类学报 18: 226.1980.

根茎肥厚,块状,外面白色,内面紫蓝色,味淡微甜,通常有块根。株高 0.5—1.7 米。叶片狭披针形,长 15—27 厘米,宽 1.8—3.5 厘米,顶端渐尖,基部圆楔形,叶面无毛,密被紫褐色腺点,叶背疏被贴伏的长柔毛;叶柄长 1—5 毫米;叶舌 2 全裂,长 1—5 毫米,无毛或有毛。穗状花序卵形至卵状椭圆形,长 3—5.5 厘米,直径 1—3 厘米;总花梗纤细,长达 24 厘米;鳞片紫色,长圆形至倒披针形,长 1—4.5 厘米;苞片紫红色,长椭圆形至长圆状倒披针形,长 2.5—4 厘米,宽 0.6—1.4 厘米,外面被毛;花白色,无梗;花萼长 1.1—1.4 厘米,顶端 2—3 齿裂,基部被毛;花冠管长约 2.5 厘米,有毛,裂片披针形,长 1.5—2 厘米,宽 5 毫米;唇瓣全长 2 厘米,中裂片倒卵形,长 1 厘米,宽 1.2 厘米,顶端圆或微凹,两侧裂片小,长约 3 毫米;花药和附属体各长 1 厘米;子房密被长柔毛。花期:8—9 月;果期:10—11 月。

产广西,生于林下石上。模式标本采自凌云。

11. 囊荷(名医别录) 野姜(江西) 图版 51: 1—5