

我国南北均有栽培。原产南美洲。

为一美丽的庭园观赏植物。

2. 兰花美人蕉(广州常见经济植物) 黄花美人蕉(华北经济植物志要) 图版 54

Canna orchoides Bailey, Man. Cult. Pl. 291. 1949; 崔友文, 华北经济植物志要 560. 1953; 侯宽昭, 广州植物志 671. 1956.

株高 1—1.5 米; 茎绿色。叶片椭圆形至椭圆状披针形, 长 30—40 厘米, 宽 8—16 厘米, 顶端具短尖头, 基部渐狭, 下延, 绿色。总状花序通常不分枝; 花大, 直径 10—15 厘米; 花萼长圆形, 长约 2 厘米, 花冠管长约 2.5 厘米, 花冠裂片披针形, 长约 6 厘米, 宽约 2 厘米, 浅紫色, 在开花后一日内即反卷下向; 外轮退化雄蕊 3 枚, 倒卵状披针形, 长达 10 厘米, 宽达 5 厘米, 质薄而柔, 似皱纸, 鲜黄至深红, 具红色条纹或溅点, 无纯白或粉红色; 发育雄蕊与退化雄蕊相似, 惟稍小, 花药室着生于中部边缘; 子房长圆形, 宽约 6 毫米, 密被疣状突起, 花柱狭带形, 分离部分长 4 厘米。花期: 夏、秋。

我国各大城市公园常有栽培。原产地为欧洲。为庭园观赏植物。

3. 粉美人蕉(华北经济植物志要)

Canna glauca L., Sp. Pl. 1. 1753; Kranz. in Engl. Pflanzenr. 56 (IV. 47): 54. 1912; Bailey, Man. Cult. Pl. 291. 1949; 崔友文, 华北经济植物志要 560. 1953.

根茎延长, 株高 1.5—2 米; 茎绿色。叶片披针形, 长达 50 厘米, 宽 10—15 厘米, 顶端急尖, 基部渐狭, 绿色, 被白粉, 边绿白色, 透明; 总状花序疏花, 单生或分叉, 稍高出叶上; 苞片圆形, 褐色, 花黄色, 无斑点; 萼片卵形, 长 1.2 厘米, 绿色; 花冠管长 1—2 厘米; 花冠裂片线状披针形, 长 2.5—5 厘米, 宽 1 厘米, 直立, 外轮退化雄蕊 3, 倒卵状长圆形, 长 6—7.5 厘米, 宽 2—3 厘米, 全缘; 唇瓣狭, 倒卵状长圆形, 顶端 2 裂, 中部卷曲, 淡黄色; 发育雄蕊倒卵状近镰形, 顶端急尖, 内卷; 花柱狭披针形。蒴果长圆形, 长 3.5 厘米。花期: 夏、秋。

我国南北均有栽培。原产南美洲及西印度群岛。

供观赏。

4. 大花美人蕉(华北经济植物志要) 美人蕉(上海植物名录) 图版 55: 1—2

Canna generalis Bailey in Hortus 118. 1930, et Man. Cult. Pl. 291. 1949; 崔友文, 华北经济植物志要 561. 1953.

株高约 1.5 米, 茎、叶和花序均被白粉。叶片椭圆形, 长达 40 厘米, 宽达 20 厘米, 叶缘、叶鞘紫色。总状花序顶生, 长 15—30 厘米(连总花梗); 花大, 比较密集, 每一苞片内有花 2—1 朵; 萼片披针形, 长 1.5—3 厘米; 花冠管长 5—10 毫米, 花冠裂片披针形, 长 4.5—6.5 厘米; 外轮退化雄蕊 3, 倒卵状匙形, 长 5—10 厘米, 宽 2—5 厘米, 颜色种种: 红、桔红、淡黄、白色均有; 唇瓣倒卵状匙形, 长约 4.5 厘米, 宽 1.2—4 厘米; 发育雄蕊披