

通常基部分枝；苞片9—11枚，花后脱落，披针形至倒卵形，长2.5—3.5厘米；花梗果时增粗；萼片白色，长3—3.5毫米，无毛；花冠管长8—10毫米，裂片线形，长10—14毫米，宽2—3毫米；退化雄蕊长3—5毫米；外轮退化雄蕊楔形，长12—14毫米，宽5—6毫米；硬革质的退化雄蕊长1.5厘米，淡黄色，通常微凹；兜状的退化雄蕊具椭圆形侧裂片；发育雄蕊长8毫米，有一狭三角形、略长于花药室的附属体；子房被绢毛。浆果干燥，不裂，污白色，直径1—1.5厘米，内有海绵质的瓢；种子2—1颗，褐色，圆或扁平，皱褶，有槽。

产我国台湾。亚洲热带地区广布。

亦有人将 *D. arundastrum* Lour. 从本种分出，作为不同的种处理。

茎可编织篮子。

2. 柊 叶 属——*Phrynium* Willd.

Willd., Sp. Pl. 1: 17. 1797; Benth. & Hook. f., Gen. Pl. 3: 653. 1883; Bak. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 6: 258. 1892; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 11 (IV. 48): 52. 1902.

多年生草本；根茎匍匐。叶基生，长圆形，具长柄及鞘。穗状花序集成头状，由叶鞘内或直接由根茎生出；苞片内有2至多花；萼片3，狭；花冠管略较花萼为长，裂片3，长圆形，近相等；退化雄蕊管较花冠管为长；外轮退化雄蕊2枚，倒卵形；内轮的2枚较小；发育雄蕊花瓣状，边缘有1个1室的花药；子房3室，每室1胚珠，稀2室是空的；花柱基部与退化雄蕊管相连合，分离部分钩状；柱头头状。果球形，果皮坚硬，不裂或迟裂；种子1—3，具薄膜质假种皮。

约30种，产亚洲及非洲的热带地区；我国有5种，产南部及西南部。

模式种：柊叶 *P. capitatum* Willd.

柊叶属分种检索表

1. 苞片顶端无刺状小尖头。
 2. 苞片长2—3厘米，顶端不皱缩。
 3. 苞片于花后不久顶端常破裂呈睫毛状；花红色、橙色或紫色。
 4. 叶片长圆形或长圆状披针形，长25—50厘米，宽10—22厘米；头状花序直径5厘米……………1. 柊叶 *P. capitatum* Willd.
 4. 叶片披针形，长35—45厘米，宽6—8厘米；头状花序直径3厘米……………2. 云南柊叶 *P. tonkinense* Gagnep.
 3. 苞片于花后不久全部撕裂呈纤维状；花白色……………3. 海南柊叶 *P. hainanense* T. L. Wu & Scajen
 2. 苞片长3.5—5厘米，顶端皱缩；花淡黄色……………4. 少花柊叶 *P. dispersum* Gagnep.
1. 苞片顶端具刺状小尖头；花白色……………5. 尖苞柊叶 *P. placentalium* (Lour.) Merr.