

6. 内轮花被裂片无或极小。

8. 花被裂片顶端 2 裂; 翅倒卵形, 长 5—7.5 毫米, 宽 3—4 毫米.....

.....8. 裂萼水玉簪 *B. oblonga* Ridl.

8. 花被裂片顶端锐尖, 不 2 裂; 翅较狭, 长约 7 毫米, 宽约 1.5 毫米.....

.....9. 透明水玉簪 *B. cryptopetala* Makino

1. 水玉簪(中国植物图鉴) 苍山贝母(中国植物图鉴) 图版 60: 1—2

Burmattia disticha L., Sp. Pl. 1: 287. 1753; Jonker, Monogr. Burm. 115. 1938; 侯宽昭等, 广州植物志 722. 1956; 广东省植物研究所, 海南植物志 4: 197.

一年生、稍粗壮草本。茎通常不分枝, 高 30—60 厘米。基生叶多数, 莲座式排列, 线形或披针形, 长 3—8 厘米, 宽 6—15 毫米; 茎生叶少数, 愈上愈小, 紧贴茎上。花序通常为二歧蝎尾状聚伞花序, 分枝长 2.5—8 厘米, 或有时仅为一花簇; 苞片披针形, 长 5—12 毫米; 翅蓝色或紫色; 花被裂片微黄色, 外轮的三角形, 长 2.5—3 毫米, 边缘质厚, 基部双边, 内轮的线状披针形, 长 1—2 毫米, 花被管筒状, 长 3—5 毫米; 花药隔顶部有 2 个锐尖的鸡冠状突起, 基部有一个长圆形的距; 子房椭圆形或倒卵形, 基部楔尖; 花柱线形, 顶 3 裂, 柱头 3。翅椭圆形, 长 1—2 厘米, 宽 1.5—3 毫米。蒴果倒卵形, 不规则开裂。花期: 夏季。

产我国福建、湖南、广东、广西、贵州、云南等省区; 生于林中潮地上。广布于亚洲热带地区及大洋洲。

2. 三品一枝花(中国植物图鉴) 少花水玉簪(海南植物志)


Burmattia coelestis D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 44. 1825; Jonker, Monogr. Burm. 120. 1938; 侯宽昭等, 广州植物志 722. 1956; 广东省植物研究所, 海南植物志 4: 184. 1976.——*B. chinensis* Gandoger in Bull. Soc. Bot. Fr. 66 (4 me serie t. xix): 290. 1919.

一年生、纤细草本。茎通常不分枝, 高 10—30 厘米。基生叶少数, 线形或披针形, 长 1—1.5 厘米, 宽 1—3 毫米; 茎生叶 2—4 片, 紧贴茎上, 线形, 长 1—2 厘米。苞片披针形, 长约 4 毫米; 花单生或少数簇生于茎顶; 翅蓝色或紫色; 花被裂片微黄, 外轮的卵形, 长 1.5—2 毫米, 顶端具小尖头, 基部双边, 内轮的三角形, 长约 1 毫米; 药隔顶部有 2 个叉开的鸡冠状突起, 基部有距; 子房椭圆形或倒卵形, 长约 5 毫米; 翅长 10—12 毫米, 宽 2—2.5 毫米; 花柱线形, 柱头 3。蒴果倒卵形, 横裂。花期: 10—11 月。

产我国浙江、江西、广东、广西、贵州、云南等省区; 生于湿地上。亚洲热带地区广布。

3. 香港水玉簪(广州植物志)

Burmattia pusilla (Wall. ex Miers) Thw. var. *hongkongensis* Jonk., Monogr. Burm. 131. fig. 11b. 1938; 侯宽昭等, 广州植物志 722. 1956.



1—2. 水玉簪 *Burmannia disticha* L. 1. 植株； 2. 花展开，示雌雄蕊。3—5. 裂萼水玉簪
B. oblonga Ridl. 3. 植株； 4. 花展开，示雄蕊； 5. 雌蕊。（黄少容绘）

一年生、纤细草本。茎通常不分枝，高9—15厘米。基生叶微小，长4—5毫米，茎生叶线形，长1—2毫米，顶端急尖。花1—3朵生于茎顶，翅蓝色；外轮花被裂片三角状卵形，长1—1.5毫米，内轮的线形，长约0.5毫米；花药隔顶端具2急尖的鸡冠状附属体，基