

花1—2朵顶生,具短梗,翅紫色;外轮花被裂片卵状三角形,长1—1.5毫米,质厚,有1条明显的脉,内轮花被裂片圆形,长仅0.2毫米;药隔顶部有2叉开的鸡冠状附属体,基部有距;子房倒卵状球形,长约3毫米;翅狭,半匙形或倒心形,长5—6毫米,宽1—2毫米;花柱粗线形,柱头3。蒴果三棱状球形,径约3毫米,横裂。花期:秋季。

产我国广东、广西、台湾;生于林下。日本亦有分布。

7. 宽翅水玉簪(新拟)

Burmanna nepalensis (Miers) Hook. f., Fl. Brit. Ind. 5: 666. 1888; Jonker, Monogr. Burm. 155. 1938; 广西植物研究所, 广西植物名录 3: 79. 1973. —*Gonyanthes nepalensis* Miers in Trans. Linn. Soc. 18: 537. t. 38. f. 1. 1841.

一年生、腐生小草本。茎纤细,高8—11厘米,白色,无叶绿素;无基生叶。茎生叶退化呈鳞片状,椭圆形,长2毫米,具明显的中脉。花排成2歧聚伞花序或仅有1—2朵花生于茎顶,直立,具短梗;翅显著,白色,常染黄,稀为淡蓝;外轮花被裂片三角状椭圆形,长0.5—1.5毫米,内轮花被裂片较小;药隔顶端具叉开的鸡冠状附属体,基部有垂悬的距;子房近球形,长1—2毫米;翅半圆形,长2—6毫米,宽1—3毫米,顶端截平或倒心形。蒴果近球形,横裂。花、果期:8—12月。

产我国云南、广西、广东、湖南;生于林下湿地上。南亚至东南亚亦有分布。

8. 裂萼水玉簪(海南植物志) 图版60: 3—5

Burmanna oblonga Ridl. in Journ. Roy. As. Soc. Straid Br. 41: 33. 1904; Jonker, Monogr. Burm. 142. 1938, et in Steen., Fl. Malesiana 4: 18. 1948. — *B. bifida* Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 54: 462. 1902, et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 6: 19. fig. 7, 1—8. 1908; Merr. & Chun in Sunyatsenia 2: 212. 1935.

一年生腐生草本。茎高8—20厘米,不分枝或有时分枝,纤细,白色;无叶绿素;无基生叶。茎生叶稀疏地贴生茎上,小而退化呈鳞片状,卵形或披针形,长1.5—2毫米;苞片披针形,长约2.5毫米。花1—2朵顶生,翅白色;花被裂片黄色,外轮的长约1.5毫米,钝2裂,内轮花被裂片无,花被管长4—5毫米;药隔顶端具2短鸡冠状突起,基部无距;子房近球形,翅倒卵形,长5—10毫米,宽3—4毫米;花柱粗线形,柱头3,漏斗形。蒴果近球形。花、果期:8—10月。

产我国广东(海南);生于密林下腐植土上。中南半岛和马来半岛亦有分布。

9. 透明水玉簪(海南植物志)

Burmanna cryptopetala Makino in Bot. Mag. Tokyo 27 (no. 313): 3, (no. 324); fig. II. 1913; Jonker, Monogr. Burm. 146. 1938; 广东省植物研究所, 海南植物志 4: 197.

一年生、腐生草本。茎高6—17厘米,纤细,通常不分枝,白色;无叶绿素;无基生叶。