

茎生叶退化呈鳞片状,紧贴或开展,披针形,长3—4.5毫米。花2—7朵排成2歧聚伞花序或单朵,直立,具短梗或近无梗;翅白色;花被裂片黄色,外轮的卵形,锐尖,长约1.5毫米,内轮的极小或无,花被管长2—3毫米;药隔顶端突起呈圆锥状,基部无距;子房卵形,长约5毫米;翅狭,长8—11毫米,宽约1.5毫米;花柱粗线形,顶端分三叉,柱头圆球形。蒴果倒卵形,长约6毫米,不规则开裂。花期:8月。

产我国广东(海南)。日本亦有分布。

2. 腐草属——*Gymnosiphon* Bl.

Bl., Enum. Pl. Jav. 1: 29. 1827; Jonker., Monogr. Burm.

168. 1938; Back. et al., Fl. Java 3: 214. 1968; Jonker in

Steen. Fl. Malesiana ser. 1. 4: 20. 1948.

一年生、纤细草本,无叶绿素。叶小,退化呈鳞片状。花3至多朵于茎顶排成单一或2歧聚伞花序,稀单花;花被管管状,花被裂片通常6片,2轮,稀1轮,外轮的花被裂片较内轮的为大,花后沿雄蕊着生处连同雄蕊、花柱一齐脱落,其余则残留于干蒴果上;雄蕊3,着生于花被管的喉部或以下,无花丝;药隔宽,无附属体,花药室于中部横裂;子房1室,侧膜胎座3,每一胎座的顶部两侧有一个球形腺体;花柱达雄蕊着生处,具3分枝,分枝顶端为柱头,上常有附属体。蒴果纵裂;种子卵形或球形,具网纹。

模式种: *G. aphyllus* Bl.

30种,产亚洲、非洲、南美洲的热带地区。我国有1种,产台湾。

1. 腐草(新拟)

Gymnosiphon nana (Fukuyama & Suzuki) Tuyama, 中井猛之进, 东亚植物图说 (Ic. Pl. As. Orient.) 3 (2): 239. 1940.——*Burmannia nana* Fukuyama & Suzuki in Journ. Jap. Bot. 12: 415. fig. 5. 6. 1936.

腐生小草本。茎纤细,高约6厘米,直立,不分枝,稍有条纹;根纤细,“之”字形曲折。叶退化呈鳞片状,披针形,在茎基呈覆瓦状排列,向上则疏离。花4朵簇生于茎顶,直立,稍白色,长约4毫米;花被管圆柱形,基部渐狭,无翅;花被裂片3,甚短;雄蕊着生于花被管的喉部,药室叉开;花柱直立,顶3裂,与花被管近等长。花期:7月。

产我国台湾;生于热带雨林下;海拔300米。模式标本采自台湾红头屿。标本未见。