

厘米，先端具长3—11毫米的芒尖，基部收狭成柄；叶柄长1—2厘米。花序顶生，常弯垂，具1—3个侧枝，圆锥状，通常有10余朵花；花苞片卵形或卵状披针形，长4—9毫米；花梗和子房长1.5—2.2厘米，无毛；花淡黄色，直径约1厘米；萼片狭长圆形，长6—9毫米，宽1.5—1.9毫米，先端短尾状，边缘皱波状，通常具3脉；花瓣与萼片相似，但中脉较粗厚；蕊柱（合生部分）长约2毫米，背侧在退化雄蕊下方具2个突出的翅；翅近方形，长约0.7毫米，中央有纵沟；能育雄蕊的花丝长约1毫米；花药近线形，长4—5毫米，基部戟形，顶端具细尖，两药室不等长；退化雄蕊近圆柱形，略短于花柱，除上端约1毫米离生外，全部贴生于花柱上；花柱（分离部分）长5—6毫米，略高出花药之上，顶端具稍膨大的柱头。蒴果圆筒形，长1.5—2厘米，直径2—3毫米；果梗长2—3毫米。 花果期5—7月。

产广东北部至南部（翁源、增城）、海南、广西西南部（龙州）和云南南部（思茅、勐腊）。生于海拔690—720米的林下。越南、老挝、柬埔寨、泰国、马来西亚、印度尼西亚和印度也有分布。模式标本采自印度尼西亚爪哇。

2. 剑叶拟兰（植物分类学报）

Apostasia wallichii R. Br. in Wall. Pl. As. Rar. 1:75.1830; Rolfe in J. Linn. Soc. Bot. 25:237.1889, et in Orch. Rev. 4:329.1896; Pfitz. in Engler, Pflanzenreich IV (50) Heft 12:7. fig. 4. 1903; E. F. de Vogel in Blumea 17(2):238. fig. 10. 1969; S. C. Chen et K. Y. Lang in Acta Phytotax. Sin. 24(5):349. 1986; Seidenf. in Opera Bot. 114:14. fig. 2. 1992.

植株高约40厘米；支柱状根从茎下部穿鞘而出，粗1.5—2.5毫米。茎近直立或下部匍伏，下部具数枚圆筒状的鞘；鞘长可达1厘米，具数条脉。叶多枚，通常生于茎中部以上，稍密集；叶片线形或近线形，长10—15厘米或过之，宽0.7—1.2厘米，先端渐尖并具长2—20毫米的芒尖，基部收狭成柄；叶柄下部扩大成鞘状并抱茎。花序从上部叶腋发出，外弯、下垂或近直立，总状或具少数侧枝而呈圆锥状，长4—7厘米，具多数花；花苞片披针形，长3—4毫米，具脉；花梗和子房长1.3—1.8厘米；花直径7—10毫米，黄色；萼片线形或狭长圆状披针形，长4—6毫米，先端具短尖，有3—5条脉；花瓣与萼片相似，但中央1枚（唇瓣）常略宽阔；蕊柱（合生部分）长1—1.5毫米；能育雄蕊花丝长约0.5毫米；花药长1.5—2.5毫米；退化雄蕊近圆柱形，除上端多少离生外，全部贴生于花柱上；花柱略高出花药，顶端具稍膨大的柱头。 花期8月。

产云南西南部（盈江）。生于海拔1000米的热带雨林下石缝中。尼泊尔、印度、孟加拉国、斯里兰卡、缅甸、越南、柬埔寨、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新几内亚岛至澳大利亚也有分布。模式标本采自尼泊尔。

3. 多枝拟兰（植物分类学报）图版1: 5—6