

7 飘带兜兰 (中国兰花)

Paphiopedilum parishii (Rehdb f) Stein, Orchideenbuch 479 1892; Pfitz in Engler, Bot Jahrb 19:41 1894, et in Engler, Pflanzenreich IV (50) Heft 12:65 fig 30 1903, Seidenf in Bot Tidsskr 67:86 fig 8 1972; S Y Hu in Quart J Taiwan Mus 27 (3—4):456 1974, Cribb in Plantsman 4(4):200 1983, et Genus Paphiopedilum 119 1987; Braem, Paphiopedilum 102 1988; Z H Tsi et S C Chen in Acta Phytotax Sin 33(3): 295 1995; Z H Tsi, S C Chen et K Mori, Wild Orch China 29 pl 24 1997; 中国兰花全书 124 图 6—6 (1) 1998 ——*Cypripedium parishii* Rehdb f in Flora 52: 322 1869; Hook f in Curtis's Bot Mag 95:t 5791 1869 ——*Selenipedilum parishii* E André, Ill Hort 22:122 t 214 1875 ——*Cordula parishii* (Rehdb f) Rolfe in Orch Rev 20(1):2 1912

附生植物，较高大。叶基生，二列，5—8枚，叶片宽带形，厚革质，长15—24（—35）厘米，宽2.5—4（—5）厘米，先端圆形或钝并有裂口或弯缺，基部收狭成叶柄状并对折而彼此互相套叠，无毛。花葶近直立，长30—40（—60）厘米，绿色，密生白色短柔毛；总状花序具3—5（—8）花；花苞片绿色，卵形或宽卵形，长2—2.5（—3）厘米，宽1.5—2.5厘米，膜质，背面基部偶见短柔毛；花梗和子房长3.5—4厘米，被短柔毛，花较大；中萼片与合萼片奶油黄色并有绿色脉，尤其在近基部处，花瓣基部至中部淡绿黄色并有栗色斑点和边缘，中部至末端近栗色，唇瓣绿色而有栗色晕，但囊内紫褐色；中萼片椭圆形或宽椭圆形，长3—4（—5）厘米，宽2.5—3厘米，先端近急尖或短渐尖，边缘向后弯卷，背面近基部多少被毛；合萼片与中萼片相似，略小；花瓣长带形，下垂，长8—9厘米，宽6—8（—10）毫米，先端钝，强烈扭转，下部（尤其近基部处）边缘波状，偶见被毛的疣状突起或长的缘毛；唇瓣倒盔状，基部有宽阔的、长达1.4—1.6厘米的柄，囊近卵状圆锥形，长2—2.5厘米，宽1.5—2厘米，囊口极宽阔，两侧各有1个直立的耳，两耳前方的边缘不内折，囊底有毛，退化雄蕊倒卵形，长1—1.3厘米，宽7—8毫米，先端具弯缺或凹缺，基部收狭。花期6—7月。

产云南南部（勐腊）。生于海拔1000—1100米的林中树干上。缅甸和泰国也有分布。模式标本采自缅甸。

8 长瓣兜兰 (中国高等植物图鉴) 图版 7: 2

Paphiopedilum dianthum T Tang et F T Wang in Bull Fan Mem Inst Biol Bot Ser 10:24 1940; S Y Hu in Quart J Taiwan Mus 27(3—4):456 1974; 中国高等植物图鉴5:609 图 8048 1976, F Mark in Orch Dig 51:78 1987, Z H Tsi, S C Chen et K Mori, Wild Orch China 25 pl 17 1997; 中国兰花全书 119 图 6—6 (2) 彩图 6—13 1998 ——*Paphiopedilum parishii* (Rehdb f) Stein var *dianthum* (T Tang et F T Wang) Karasawa et Saito in Bull Hiroshima Bot Gard 5:38 1982; Cribb et C Z