

色，中萼片近圆形或宽卵形，长2.8—3.2厘米，宽2.2—2.7(—4)厘米，先端钝，基部有短柄，背面被短柔毛；合萼片明显小于中萼片，卵形或卵状椭圆形，长2.3—2.5厘米，宽1.2—1.5厘米，先端钝或浑圆，背面亦被毛；花瓣狭长圆形或略带匙形，长3—4厘米，宽约1厘米，边缘波状，先端钝，基部疏被长柔毛；唇瓣倒盔状，基部具宽阔的、长1.5—2厘米的柄；囊近卵形，长2—2.5厘米，宽1.5—2厘米，囊口极宽阔，两侧各具1个直立的耳，两耳前方的边缘不内折，囊底有毛，退化雄蕊宽倒卵形，长6—7毫米，宽7—8毫米，基部略有耳，上面中央具1个脐状突起。花期10—12月。

产广西北部 and 贵州。生于海拔800—1500米的石灰岩山丘荫蔽多石之地或岩隙中。

12 亨利兜兰 (中国兰花)

Paphiopedilum henryanum Braem in Schlechteriana 1 (1): 3 pl 1987, et 2 (4): 160, 161 (pl) 1991; Seidenf in Opera Bot 114: 19 1992, Averyanov, Iden Guide Vietnam Orch 20 1994; Z. H. Tsi, S. C. Chen et K. Mori, Wild Orch China 25 pl 19 1997, 中国兰花全书 122 图 6—4 (6) 彩图 6—14 1998 —— *Paphiopedilum dollu* E. Lueckel in Orchidee 38 (5): 266 fig 1987

12a 亨利兜兰 (原变种) 图版 8: 2

var *henryanum*

地生或半附生植物。叶基生，二列，通常3枚；叶片狭长圆形，长12—17厘米，宽1.2—1.7厘米，先端钝，上面深绿色，背面淡绿色或有时在基部有淡紫色晕，背面有龙骨状突起，基部收狭成叶柄状并对折而彼此套叠。花葶直立，长16—22厘米，绿色，密生褐色或紫褐色毛，顶端生1花；花苞片近椭圆形，绿色，围抱子房，长2—2.6厘米，宽6—12毫米，先端钝，背面被栗色微柔毛，尤以近基部及中脉上为多，花梗和子房长3—4厘米，密被紫褐色短柔毛；花直径约6厘米；中萼片奶油黄色或近绿色，有许多不规则的紫褐色粗斑点，合萼片色泽相近但无斑点或具少数斑点，花瓣玫瑰红色，基部有紫褐色粗斑点，唇瓣亦玫瑰红色并略有黄白色晕与边缘；中萼片近圆形或扁圆形，长3—3.4厘米，宽3—3.8厘米，先端钝或略具短尖，上半部边缘略波状，背面被微柔毛；合萼片较狭窄，长2.7—3.5厘米，宽1.4—1.6厘米，背面亦被微柔毛；花瓣狭倒卵状椭圆形至近长圆形，长3.2—3.6厘米，宽1.4—1.6厘米，边缘多少波状，先端有不甚明显的3小齿，内表面基部偶见疏柔毛，边缘有缘毛；唇瓣倒盔状，基部具宽阔的、长约1.5厘米的柄；囊近宽椭圆形，长2.3—2.5厘米，宽约2.5厘米，囊口极宽阔，两侧各具1个直立的耳，两耳前方边缘不内折，囊底有毛；退化雄蕊倒心形至宽倒卵形，长6—7毫米，宽7—8毫米，基部有耳，上面中央具1枚齿状突起。花期7—8月。

产云南东南部 (麻栗坡、马关)。生于林缘草坡上，海拔不详。越南也有分布。模式标本为栽培植物，据云采自中越边界。