

米，宽4毫米，先端渐尖；花瓣白色，斜倒披针形，近镰状，长8毫米，宽2.5毫米，先端钝，无毛，具3脉；唇瓣白色，宽卵状披针形，长8.5毫米，宽约5毫米，近3裂，具7脉，基部凹陷，长囊状，内面具多数腺毛，前部骤狭呈长圆状披针形裂片，先端近急尖，稍向下弯，上面中部具2枚褶片；蕊柱短，长约1毫米；花药卵状披针形，先端渐尖，且向上弯；蕊喙直立，长约4毫米，叉状2裂，裂片钻形。花期7—9月。

产西藏东南部（察隅）。生于海拔2100米的针阔混交林下阴湿处。尼泊尔、锡金、不丹也有。模式标本采自锡金。

13. 南湖斑叶兰（台湾兰科植物）

Goodyera nankoensis Fukuyama in Bot. Mag. Tokyo 48: 432. 1934; 台湾兰科植物 1: 178—179 (图). 1975; 台湾兰科植物彩色图鉴 2: 538. 1990.

植株高约9厘米。根状茎伸长，茎状，匍匐，具节。茎直立，绿色，或多或少被疏柔毛，基部具4—5枚叶，向上在叶和总状花序基部花之间具2—3枚鳞片，鳞片披针形，长1—1.5厘米，先端渐尖，无毛。叶直立伸展，叶片小，卵形，长约2厘米，中部以下宽1.3厘米，两面无毛，背面淡绿色，上面绿色，沿中肋具1条白色的带，先端稍钝，基部圆形，具柄，叶柄长1厘米，基部扩大成鞘。总状花序直立，长约4厘米，具10—15朵稍密生，近偏向一侧的花；花苞片卵状披针形，长约1厘米，膜质，先端渐尖，下部的较子房稍长，上部的逐渐变短；子房圆柱状纺锤形，被细毛，连花梗长7—8毫米；花白色略带红晕，半张开；萼片近等大，凹陷，具1脉，背面无毛，中萼片披针形，长6毫米，宽2.2毫米，向先端收狭，先端急尖，与花瓣粘合呈兜状；侧萼片斜卵状披针形，长7毫米，基部宽3毫米，先端急尖；花瓣与中萼片等长，中部稍增宽，宽2.2毫米，先端钝头，基部收狭，无毛，具1脉；唇瓣长5—6毫米，基部宽2.6毫米，卵状舟形，前部舟状，先端急尖，常向下弯，基部凹陷呈囊状，囊高3—3.5毫米，内面无毛；蕊柱短，粗，长约1.5毫米；花药卵状心形，先端急尖；花粉团长1.3毫米；蕊喙短，长不及1毫米，2裂。花期7—8月。

产我国台湾省。生于海拔2000—2500米的高山林下阴湿处苔藓丛中。模式标本采自台湾（台北）。本种标本未见，上面描述系摘自其原始文献描述和《台湾兰科植物》（1975）。在《台湾植物志》（1978）记载其唇瓣基部囊内具腺毛，恐它与本种可能不属同一物。有待今后进一步研究。

14. 多叶斑叶兰（中国高等植物图鉴） 高岭斑叶兰（台湾兰科植物、台湾兰科植物彩色图鉴）、厚唇斑叶兰（台湾植物志）

Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. ex Clarke in J. Linn. Soc. Bot. 25: 73. 1889; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. 32 (2): 29, fig. 2. 1978, et in Opera Bot. 114: 29. 1992. — *Georchis foliosa* Lindl., Gen. Sp. Orch. pl. 496. 1840. — *Goodyera foliosa* (Lindl.) Benth. ex Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 113. 1890; Tuyama in H. Hara, Fl.