

7毫米，凹陷，基部向后凸出，先端向后反曲；侧萼片偏斜的卵形，长6—7毫米，宽4—5毫米；花瓣白色，偏斜的镰状，长6—7毫米，宽2.5毫米，具1脉，极不等侧，内侧宽0.5毫米，外侧宽2毫米，与中萼片粘合呈兜状；唇瓣白色，长约15毫米，基部具圆锥状的距，前部扩大成Y字形并2裂，裂片三角状卵形，长5毫米，基部宽2毫米，先端稍钝，外侧边缘波状，其基部具1枚小尖齿，中部收狭成长5—6毫米、两侧边缘各具5—6条长约4毫米的流苏状细条的爪；距上举指向唇瓣，末端2浅裂，其内侧在近中部处具2枚胼胝体。花期2月。

产我国香港。生于林中阴湿处。模式标本采自香港（新界）。

16. 浙江金线兰（浙江植物志） 浙江开唇兰（植物研究、福建植物志） 图版30: 9—10

*Anoectochilus zhejiangensis* Z. Wei et Y. B. Chang in Bull. Bot. Res. 9 (2): 39, fig. 4. 1989; 浙江植物志 7: 521, 图 7—698. 1993; 福建植物志 6: 666, 图 593. 1995.

植株高8—16厘米。根状茎匍匐，淡红黄色，具节，节上生根。茎淡红褐色，肉质，被柔毛，下部集生2—6枚叶，叶之上具1—2枚鞘状苞片。叶片稍肉质，宽卵形至卵圆形，长0.7—2.6厘米，宽0.6—2.1厘米，先端急尖，基部圆形，边缘微波状，全缘，上面呈鹅绒状绿紫色，具金红色带绢丝光泽的美丽网脉，背面略带淡紫红色，基部骤狭成柄；叶柄长约6毫米，基部扩大成抱茎的鞘。总状花序具1—4朵花，花序轴被柔毛；花苞片卵状披针形，膜质，长约6.5毫米，宽约3.5毫米，先端渐尖，背面被短柔毛，与子房近等长或稍长；子房圆柱形，不扭转，淡红褐色，被白色柔毛，连花梗长约6毫米；花不倒置（唇瓣位于上方）；萼片淡红色，近等长，长约5毫米，背面被柔毛，中萼片卵形，凹陷呈舟状，先端急尖，与花瓣粘合呈兜状，侧萼片长圆形，稍偏斜；花瓣白色，倒披针形至倒披针形；唇瓣白色，呈Y字形，基部具圆锥状距，中部收狭成长4毫米、两侧各具1枚鸡冠状褶片且其边缘具(2—)3—4(—5)枚长约3毫米小齿的爪，前部扩大并2深裂，裂片斜倒三角形，长约6毫米，上部宽约5毫米，边缘全缘；距长约6毫米，上举，向唇瓣方向翘起几成U字形，末端2浅裂，其内具2枚瘤状胼胝体，胼胝体生于距中部从蕊柱紧靠唇瓣处伸入距内的2条褶片状脊上；蕊柱短；蕊喙直立，叉状2裂；柱头2个，离生，位于蕊喙的基部两侧。花期7—9月。

产浙江（遂昌）、福建（建阳、将乐）、广西（龙胜）。生于海拔700—1200米的山坡或沟谷的密林下阴湿处。模式标本采自浙江（遂昌）。

本种营养体与金线兰 [*A. roxburghii* (Wall.) Lindl.] 颇相似，但唇瓣前部的2枚裂片较宽，倒的斜三角形，爪部两侧各具1枚上面具(2—)3—4(—5)枚小齿的鸡冠状褶片，决非流苏状而易区别。

17. 峨眉金线兰（植物分类学报） 峨眉开唇兰（植物分类学报、植物学集刊）



图版 30 1—4. 峨眉金线兰 *Anoectochilus emeiensis* K. Y. Lang: 1. 全株, 2. 花, 3. 唇瓣、侧萼片、花瓣和中萼片, 4. 唇瓣前部裂片和爪部的片的边缘的形状; 5—8. 金线兰 *A. roxburghii* (Wall.) Lindl.: 5. 花, 6. 侧萼片、花瓣和中萼片, 7. 距纵剖面示胼胝体的形状和着生位置, 8. 蕊柱侧面观示花药、蕊喙、柱头和蕊柱的附属物; 9—10. 浙江金线兰 *A. zhejiangensis* Z. Wei et Y. B. Chang: 9. 花, 10. 侧萼片、花瓣和中萼片。(吴彰桦绘)