

本属模式种: *Corybas aconitiflorus* Salisb.

全属约有 100 种, 主要分布于大洋洲和热带亚洲, 向北可达我国南部。我国有 3 种。

分种检索表

1. 花苞片钻状; 花瓣长达 26 毫米 3. 铠兰 *C. sinii* T. Tang et F. T. Wang
1. 花苞片披针形或线状披针形; 花瓣长 8.5—10 毫米。
 2. 唇瓣基部无胼胝体; 花苞片明显长于子房 ... 1. 台湾铠兰 *C. taiwanensis* T. P. Lin et S. Y. Leu
 2. 唇瓣基部有 1 个大的胼胝体; 花苞片仅略长于子房 2. 大理铠兰 *C. taliensis* T. Tang et F. T. Wang
1. 台湾铠兰 (新拟) 红盔兰 (台大研究报告)

Corybas taiwanensis T. P. Lin et S. Y. Leu in *Taiwania* **20** (2): 162. pl. 1. 1975; 台湾兰科植物 **2**: 99—100 图. 1977; 台湾兰科植物彩色图鉴 **1**: 436. 1977, et **2**: 457. 1990; 台湾植物志 **5**: 932. 1978; J. Dransf. et al. in *Kew Bull.* **41** (3): 590. 1986; 台湾兰科植物彩色图志 **1**: 268. 1996.

地下块茎近球形, 长 3—4 毫米, 宽约 3 毫米。茎直立, 中部有节, 节以下长约 1.5 厘米, 位于地下, 有毛, 节以上长约 1.7 厘米, 位于地上, 无毛。叶 1 枚, 生于茎上端, 叶片心形, 长约 1.5 厘米, 宽 1.6 厘米, 具网状脉, 无柄。花苞片披针形, 长约 5 毫米; 子房长约 3 毫米; 花淡紫红色, 无梗; 中萼片线形, 长 1.3 厘米, 宽 2 毫米, 内弯, 先端钝; 侧萼片位于唇瓣下方, 丝状, 长 1.3 厘米, 下部约有 3 毫米彼此合生; 花瓣丝状, 长约 1 厘米; 唇瓣长约 1.7 厘米, 下部管状, 上部扩大, 圆形至椭圆形, 宽约 1 厘米, 前部边缘流苏状; 唇盘上有数条暗红色条纹; 距 2 个, 生于唇瓣基部, 弯曲成角状, 长约 3 毫米; 蕊柱宽椭圆形, 长约 3.5 毫米; 柱头突出, 杯状。花期 8 月。

产台湾北部 (桃园)。生于海拔 1 400 米的林下铺满苔藓的岩壁上。(模式标本产地)

台湾标本未看到。上面描述系摘自新种的原描述 (1975)。

2. 大理铠兰 (植物分类学报) 图版 33: 8—9

Corybas taliensis T. Tang et F. T. Wang in *Acta Phytotax.* **1** (2): 185. 1951; S. Y. Hu in *Quart. J. Taiwan Mus.* **26** (1—2): 132. 1973; 中国高等植物图鉴 **5**: 643. 图 8116. 1976; 横断山区维管植物 **2**: 2548. 1994.

块茎近球形, 直径约 5 厘米。茎纤细, 长 2.5—7.5 厘米。叶 1 枚, 生于茎上端, 心形至宽卵形, 长 8.5—14 毫米, 宽 8—10.5 毫米, 先端短渐尖, 基部无柄, 抱茎, 具浅色网状脉。花苞片线状披针形, 略长于子房; 花单朵, 带紫色; 中萼片直立, 匙形, 兜