

脉；花瓣卵状披针形，长3—3.3毫米，宽1.2—1.8毫米，先端稍钝，肉质增厚，具1脉；唇瓣宽卵形至心形，基部略凹陷呈浅囊状，长4—5毫米，宽3—3.5毫米，肉质增厚，上面中部至基部具2条短的、呈叉状的脊状隆起；蕊柱粗短，长约1.5毫米；药室倒卵形，近并行，先端钝；花粉团倒卵球形，具短的花粉团柄和粘盘，粘盘卷成角状；蕊喙大，显著，三角状，高约1毫米；柱头2个，隆起，狭棒状，末端略膨大，从蕊喙穴下沿两侧向外伸出；退化雄蕊2个，近方形，先端稍斜而钝。花期7—8月。

产于四川（西部，汶川以南）、云南（西北部至东北部）、西藏（东南部至南部）。生于海拔1950—3900米的山坡林下、冷杉林缘、高山灌丛草甸或高山草甸中。尼泊尔、不丹和锡金也有。模式标本采自锡金。

14. 宽叶角盘兰（植物分类学报）

Herminium latifolia Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris ser. 2, 3: 325. 1931 (non *Peristylus latifolius* Lindl.); K. Y. Lang in Acta Phytotax. Sin. 26 (3): 183. 1988. — *Peristylus ecalcaratus* acut. non Finet: T. Tang et F. T. Wang in Acta Phytotax. 1: 64. 1951. — *Peristylus tangianus* S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. 27 (3—4): 462. 1974.

植株高20—30厘米。块茎圆球形或椭圆形，长1—2厘米，直径1—1.5厘米，肉质。茎颇粗壮，直立，无毛，基部具2—3枚筒状鞘，中部之下具叶，在叶之上具苞片状小叶。叶（2—）3枚，叶片圆形或椭圆形，长2.5—5厘米，宽2—2.5厘米，直立伸展，先端近渐尖或稍钝，基部收狭成抱茎的鞘。总状花序具极多数较密生的小花，狭圆柱形，似穗状，长4—10厘米；花苞片披针形，直立伸展，长6—7毫米，先端渐尖，稍短于子房；子房近圆柱状，顶部稍渐狭，扭转，无毛，连花梗长8毫米；花极小，白色；中萼片卵形，长2.5毫米，宽1.6毫米，先端渐尖或钝，具1脉；侧萼片倒披针形，长2.6毫米，宽1毫米，先端钝，具1脉；花瓣斜卵形，长1.2—2.4毫米，宽1.2毫米，先端钝，具1脉；唇瓣轮廓为提琴形，长2.5毫米，宽1.4毫米，基部具槽，无距，边缘增厚粗糙，基部之上缢缩且具蜂巢状小凹穴，中上部呈卵形，先端钝并且向下弯曲；蕊柱短；花粉团的粘盘椭圆形，长0.8毫米。花期不详。

产于云南（昆明附近）。模式标本产地。

15. 披针唇角盘兰（植物分类学报）

Herminium singulum T. Tang et F. T. Wang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. ser. 10: 35. 1940; K. Y. Lang in Acta Phytotax. Sin. 26 (3): 183. 1988; 横断山区维管植物 2: 2530. 1994.

植株高8—30厘米。块茎圆球形，长约1厘米，肉质。茎直立，直径约2毫米，无毛，基部具1—2枚筒状鞘，其上具1枚叶，在叶之上具2枚疏生的苞片状小叶。叶直立伸展，叶片椭圆形，长2—4厘米，宽1—2.5厘米，先端钝或急尖，基部渐狭成抱茎