

宽1.5—3.5厘米，先端急尖或渐尖，基部骤狭成抱茎的短鞘，叶上面有时具少数或多而密的紫红色斑点。总状花序具几朵至10余朵花，常偏向一侧；花苞片披针形，直立伸展，先端渐尖，最下面的长于子房或长于花；子房圆柱状纺锤形，长5—6毫米，扭转，稍弧曲，无毛；花紫红色或粉红色；萼片彼此紧密靠合成兜，兜长5—7毫米，宽3—4毫米；中萼片长5—6毫米，宽约1.5毫米，先端急尖，具1脉；侧萼片斜镰状披针形，长6—7毫米，基部宽1.8毫米，先端急尖，具1脉；花瓣披针状线形，长约5毫米，宽约0.5毫米，先端急尖，具1脉，与萼片贴生；唇瓣向前伸展，长7—9毫米，上面和边缘具细乳突，基部楔形，中部3裂，侧裂片线形，先端急尖，具1脉，中裂片较侧裂片长而稍宽，宽0.8毫米，向先端渐狭，端钝，具3脉；距细圆筒状圆锥形，长4—5毫米，中部向前弯曲，近呈U字形。花期8—9月。

产于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西（秦岭以北）、甘肃、青海、安徽、浙江、江西、福建、河南、四川西部、云南西北部、西藏东部至南部。生于海拔400—4100米的山坡林下或草地。朝鲜半岛、日本、俄罗斯西北利亚地区至中亚、蒙古、西欧、尼泊尔也有分布。模式标本采自俄罗斯西伯利亚。

2. 二狭叶兜被兰 (植物分类学报) 图版 60: 1—4

Neottianthe angustifolia K. Y. Lang in Acta Phytotax. Sin. 35 (6): 538, t. 1 (1—4). 1997.


植株高11—21厘米。块茎卵形，长0.8—1厘米。茎直或近直立，基部具1—2枚圆筒状鞘，其上具2枝叶，在叶之上具1—3枚狭披针形、渐尖的不育苞片。叶近对生，叶片狭长圆形，长3—5厘米，宽5—8毫米，先端渐尖，基部收狭成抱茎的鞘，叶柄短或较长。总状花序具4—16朵花，偏向一侧，长2.5—8厘米，花序轴无毛；花苞片披针形，直立伸展，长5—6毫米，先端渐尖，短于子房；子房纺锤状圆柱形，长6—7毫米，扭转，无毛；花粉红色，萼片4/5紧密靠合成兜，兜长6—7毫米，基部宽4毫米；中萼片披针形，长5—6毫米，基部宽1.3—1.5毫米，先端渐尖，具1脉；侧萼片斜披针形，长6—7毫米，基部宽1.5—1.8毫米，先端渐尖，具1脉；花瓣线形，长4—5毫米，宽0.25—0.3毫米，先端渐尖，具1脉，与萼片贴生；唇瓣向前伸展，长7—8毫米，上面和边缘具细乳突，中部之下3裂，侧裂片线形，长3—4毫米，宽0.3—0.4毫米，具1脉；中裂片线状披针形，长5—5.5毫米，宽1—1.2毫米，具3脉；距细圆锥状，中部弯曲，近呈U字形，长4—4.5毫米，基部宽1毫米，向末端渐狭，末端钝。

花期8—9月。

产河北（枣庄）、四川（小金、丹巴）。生于山坡林下，海拔2000—2600米。模式标本采自四川（小金）。

3. 密花兜被兰 (中国高等植物图鉴)

Neottianthe calcicola (W. W. Smith) Schltr. in Acta Hort. Gothob. 1: 136. 1924;



图版 60 1—4. 二狭叶兜被兰 *Neottianthe angustifolia* K. Y. Lang: 1. 全株, 2. 花, 3. 花瓣与靠合成兜的萼片贴生, 4. 中萼片、花瓣、侧萼片和唇瓣; 5—8. 长圆叶兜被兰 *N. oblonga* K. Y. Lang: 5. 全株, 6. 花, 7. 花瓣与靠合成兜的萼片贴生, 8. 中萼片、花瓣、侧萼片和唇瓣; 9—12. 卵叶兜被兰 *N. ovata* K. Y. Lang: 9. 全株, 10. 花, 11. 花瓣与靠合成兜的萼片贴生, 12. 中萼片、花瓣、侧萼片和唇瓣。(吴影桦绘)