

基部处，近直立，高于蕊柱；花粉团 2 个，粒粉质，由可分的小团块组成，上端具 1 条共同的花粉团柄，末端有类似粘盘的粘质物；无明显的蕊喙；柱头顶生。

本亚族仅含 1 属，分布于自泰国至菲律宾、新几内亚岛和所罗门群岛，向北到达我国云南南部、台湾和日本琉球群岛。

65. 肉药兰属 *Stereosandra* Bl.

Bl., Mus. Bot. Lugd. Bat. **2**: 176. 1856.

腐生草本，地下具纺锤状的、直生的块茎。茎直立，具节，多少肉质，无绿叶，中下部被数枚鳞片状或圆筒状鞘。总状花序顶生，具数朵至 10 余朵花；花苞片较小；花梗短；子房膨大，明显宽于花梗；花小，不甚张开，常多少下垂；萼片与花瓣离生，相似；唇瓣与花瓣相似，但较宽，不裂，凹陷，边缘波状且内弯，基部具 2 枚胼胝体，无距；蕊柱粗短，近圆柱形，无蕊柱足；花药生于蕊柱背面基部，近直立，有宽阔而长于蕊柱的花丝；花粉团 2 个，粒粉质，由可分的小团块组成，具 1 个共同的花粉团柄，无粘盘；柱头生于蕊柱顶端，无明显蕊喙。

单种属，主要分布于东南亚，向东南至新几内亚岛，北至泰国、我国南部和日本琉球群岛。

1. 肉药兰（中国野生与栽培兰花） 图版 27: 7—8

Stereosandra javanica Bl., Mus. Bot. Lugd. Bat. **2**: 176. 1856; Garay et Sweet, Orch. South. Ryukyu Isl. 57. 1974; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **32** (2): 173. fig. 107. 1978; H. J. Su in Quart. J. Chin. For. **20** (4): 104. 1987; 台湾兰科植物彩色图鉴 **2**: 655. 1990. — *Stereosandra koidzumiana* Ohwi in J. Jap. Bot. **13**: 44. 1937. — *Stereosandra liukiuensis* Tuyama in Nakai, Icon. Pl. Asiae Orient. **2**: 182. t. 68. 1938.

植株高达 30 厘米；地下块茎梭状。茎直立，白色而带红棕色，无绿叶，下部有多枚鳞片状鞘。总状花序具少数花；花苞片长 6—7 毫米；花梗和子房长约 1 厘米；花下垂，不完全张开；萼片与花瓣相似，披针形，长 7—9 毫米，宽约 2.5 毫米；唇瓣卵状披针形，长约 8 毫米，宽约 3.5 毫米，近基部两侧各有 1 个胼胝体；蕊柱短；花药着生于蕊柱后方基部，高举于蕊柱上方，与蕊柱完全分离；柱头生于蕊柱顶端。蒴果椭圆形，长约 7 毫米。花期不详。

产台湾南部（恒春半岛）和云南南部（勐海）。生于海拔 1200 米以下的低海拔地区常绿林下。日本琉球群岛、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、泰国和新几内亚岛也有分布。模式标本采自印度尼西亚爪哇。