

产福建西部。生于阴湿岩石上，海拔约 900 米。（模式标本产地）。

此种自发表以后未曾再采到，上面描述是摘自原记载。《福建植物志》（6: 630. 图 553. 1995）中所谓的大唇羊耳蒜 *Liparis dun nii* Rolfe 实际上与《中国高等植物图鉴》（5: 674. 图 8178. 1976）的大唇羊耳蒜是同一物，均属于上种而非真正的 *Liparis dun nii*。我们看到了模式标本上的花，其胼胝体很特别，不同于 *Liparis pauliana*，但胼胝体是否有变化尚缺乏足够的证据，故后者暂予保留。

10. 阿里山羊耳蒜（新拟）

Liparis sasakii Hayata, Icon. Pl. Formos. **4**: 32. fig. 9. 1914; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **27**: 425. 1974; 台湾兰科植物彩色图鉴 **1**: 475. 1977, et **2**: 580. 1990. ——*Liparis krameri* Franch. et Sav. var. *sasakii* (Hayata) Hashimoto in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo ser. B. **13** (1): 39. 1987. ——*Liparis makinoana* auct. non Schltr.; 台湾植物志 **5**: 1044. 1978.

地生草本。叶 2 枚，倒卵形，膜质或草质，长约 5 厘米，宽约 2.5 厘米，先端急尖或钝，基部楔形，近无柄，无关节。花葶长约 8 厘米；总状花序长约 2 厘米，具 5 朵花；花苞片小，卵状三角形，长 2—3 毫米；花梗和子房长约 8 毫米；花暗紫色；萼片线状披针形，长 1.3 厘米，宽约 3 毫米，先端渐尖，具 3 脉，边缘外卷；侧萼片稍斜歪；花瓣线形，长约 1.2 厘米，宽约 1 毫米；唇瓣圆的倒卵形，长约 1 厘米，宽约 6 毫米，先端浑圆并具短尾（尾长 1.5 毫米），边缘具缘毛，近基部有 1 个胼胝体；蕊柱长约 3 毫米，向前弯曲，两侧有宽约 0.5 毫米的翅。花期 5 月。

产台湾阿里山。生于林下，海拔约 1500 米。（模式标本产地）

据原描述，本种与 *Liparis makinoana* Schltr. 有明显的不同，特别是本种唇瓣先端短尾状，边缘具缘毛，基部有 1 个胼胝体。由于未看到台湾标本，上面描述摘自《台湾植物志》（5: 1044. 1978）和原描述。

11. 尾唇羊耳蒜（新拟）

Liparis krameri Franch. et Savat., Enum. Pl. Jap. **2**: 509. 1879; Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 199. 1919; Ohwi, Fl. Japan (Engl. ed.) 347. 1965; F. Maekawa, Wild Orch. Japan Col. 355. pl. 130. 1971; Kitagawa, Neo-Lin-eam. Fl. Mansh. 196. 1979; 中国兰花全书 193. 1998. ——*Leptorchis krameri* (Franch. et Savat.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 671. 1891. ——*Liparis krameri* Franch. et Savat. var. *viridis* Makino in J. Jap. Bot. **3**: 21. 1926; 东北植物检索表（第二版）899. 1995.

地生草本。假鳞茎较小，外被白色的薄膜质鞘。叶 2 枚，宽卵形或卵形，膜质或草质，长 2—3（—8）厘米，宽 2—4 厘米，先端钝或近急尖，边缘具明显不规则粗齿，基部圆形并下延成鞘状柄，无关节；鞘状柄长 0.5—3 厘米。花葶长 6—7 厘米（记载可