

地生草本。假鳞茎卵形，长1—2厘米，直径7—13毫米，有节，外被白色、薄膜质鞘。叶2枚，平展，卵状椭圆形至卵形，膜质或草质，长5—13厘米，宽2.5—7.3厘米，先端渐尖，全缘，基部收狭成鞘状柄，无关节；鞘状柄长2—5.5厘米，围抱花葶基部。花葶长11—29厘米，比叶长1倍以上；总状花序具10—20朵花；花苞片披针形，反折，长4—6毫米，在花序下方的不育苞片更长，有时长可达1厘米；花梗和子房长8—9毫米；花绿色；中萼片披针状线形，长7—8毫米，宽约1.5毫米，先端略钝，具不明显的3脉；侧萼片略短而宽；花瓣狭线形或近丝状，长7—8毫米，宽约0.5毫米，具1脉；唇瓣倒卵形至近宽椭圆形，长7—8毫米，宽5—7毫米，先端钝或近截形，上半部边缘至先端具不规则细齿，基部收狭，有一暗色肥厚的纵带从基部延伸至中部以上，带基部有2个小的胼胝体，胼胝体基部多少相连；蕊柱长2.5—4毫米，稍向前弯曲，上部有翅。花期7—8月。

产四川西南部（西昌）和云南西北部至南部（贡山、永胜、景洪）。生于林下，海拔1100—1700米。老挝和泰国也有分布。模式标本采自云南永胜。

我们未看到此种的模式标本，但根据唐进、汪发纘教授在1938年从柏林植物园博物院模式标本上所绘的草图看，确信本种与 *Liparis sutepensis* 是同一个种。

14. 滇南羊耳蒜（植物分类学报）

Liparis siamensis Rolfe ex Downie in Kew Bull. 371. 1825; Gagnep. in Lecomte, Fl. Génér. Indo-Chine 6: 185. 1932; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. 31 (1): 24. fig. 13. 1976, et Opera Bot. 114: 131. 1992; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. 33 (3): 294. 1995, pro parte.

地生草本。假鳞茎卵形，长1—2厘米，直径8—15毫米，有节，外被白色的薄膜质鞘。叶2枚，卵状椭圆形或椭圆形，膜质或草质，长6.5—15.5厘米，宽3—6.5厘米，先端急尖或短渐尖，全缘，基部收狭成鞘状柄，无关节；鞘状柄长2—6厘米，围抱花葶基部。花葶长10—20厘米；总状花序具数朵至10余朵花；花苞片披针形，长4—7毫米，多少反折；花梗和子房长1.1—1.5厘米；花绿色；中萼片狭长圆形，长7.5—8.5毫米，宽约1.8毫米，先端钝，具3脉；侧萼片长圆状卵形，稍斜歪，长6—7毫米，宽约3毫米，先端钝，具5脉；花瓣狭线形，向顶端渐宽，长7—8毫米，宽约0.7毫米，具1脉；唇瓣倒卵状横长圆形，长5—5.5毫米，上部宽约7毫米，先端微缺，边缘具不规则细齿，基部收狭成短爪并有1个胼胝体；胼胝体高约1毫米，顶端2裂；蕊柱长3—3.5毫米，向前弯曲，两侧有狭翅。花期8月。

产云南南部（景洪）。生于林下，海拔700米。老挝、泰国、缅甸也有分布。模式标本采自泰国。

15. 香花羊耳蒜（中国高等植物图鉴） 图版11: 6—8

Liparis odorata (Willd.) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 26. 1830; Matsumura et