

胚体；胚体三角形，高0.8—1毫米；蕊柱长6—8毫米，两侧有狭翅；药帽长约2毫米。蒴果倒卵状长圆形，长约2.8厘米，宽约1厘米；果梗长6—9毫米。花期2—5月，果期11月。

产台湾、广东南部、海南、广西、贵州西南部（兴义）、云南中部至东南部（安宁、临沧、麻栗坡）和西藏东南部（墨脱）。生于常绿阔叶林下或阴湿的岩石覆土上或地上，海拔500—1700米。泰国和越南也有分布。模式标本采自泰国。

据苏鸿杰（1988）（中华林学季刊20（4）：103. pl. 3）研究，*Liparis henryi* Rolfe为本种与见血清（*Liparis nervosa*）的中间类型，而林赞标（台湾兰科植物2：233. 1977）则认为与*Liparis formosana*为同一物。《台湾植物志》承认此种。我们认为苏鸿杰的观点比较客观，但作为独立的种似乎并无明显的特征可用。故暂归并于本种，以待后人的研究。

18. 插天山羊耳蒜（台湾植物志）

Liparis sootenzanensis Fukuyama in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard. 3: 84. 1933; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. 27 (3, 4): 428. 1974; 台湾兰科植物2: 238—239 (图). 1977. — *Liparis nigra* Seidenf. var. *sootenzanensis* (Fukuyama) T. S. Liu et H. J. Su, Nat. Orch. Taiwan (ed. 2) 165. pl. 26 (2). 1975; 台湾植物志5: 1047. 1978. — *Liparis macrantha* Rolfe var. *sootenzanensis* (Fukuyama) S. S. Ying, Col. Illustr. Indig. Orch. Taiwan 1: 224. 1977.

地生草本，较粗壮。茎（或假鳞茎）圆柱状，肥厚，肉质，有数节，近似上种，但更粗壮，近基部直径可达2—3厘米。叶数枚，长可达18厘米，宽可达8厘米，先端渐尖，基部收狭为鞘状柄，无关节。花葶长可达20厘米，粗壮，横断面呈多角形，有狭翅；总状花序具10余朵花；花苞片卵形，长约4.5毫米，宽约2.3毫米，绿色；花梗和子房长约1.4厘米；花淡绿色；萼片狭椭圆形，长1.4—1.5厘米，宽约4毫米，先端急尖，边缘外卷；侧萼片稍斜歪；花瓣丝状，长约1.4厘米；唇瓣倒卵形，长约1.4厘米，宽约1.1厘米，在靠近中部处反折，基部收狭，上部边缘具细齿；蕊柱长约8毫米，向前弯曲。蒴果较大，淡绿色，长约2.7厘米，宽约9毫米；果梗长约1.1厘米。花期4—5月，果期不详。

产台湾（屏东、台东、南投、嘉义、花莲）。生于疏林下，海拔1000—1500米。模式标本采自台湾插天山。

未看到台湾标本。上面描述摘自《台湾兰科植物》（1977）和《台湾植物志》（1978）。

19. 翼蕊羊耳蒜（新拟）

Liparis regnieri Finet in Bull. Soc. Bot. France 55: 338. fig. 2. 1908; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. 31 (1): 20. fig. 8. 1976, et Opera Bot. 114: 130. 1992; Av-