

11 毫米,先端浑圆或近截形,具短尖,边缘有不规则细齿,基部收狭,有 2 个胼胝体;蕊柱长约 5 毫米,稍向前弯曲,上端在柱头两侧具翅,翅下弯成长约 1.1 毫米的钩;药帽较长,近长圆形。蒴果倒卵形,长 1—1.2 厘米,宽 6—7 毫米;果梗长 9—15 毫米。

花期 9—11 月,果期次年春季。

产海南、广西、四川西南部(峨眉山、屏山)和云南东南部(西畴、屏边)。生于林中或溪谷旁的树上或岩石上,海拔 500—1600 米。越南、泰国也有分布。模式标本采自越南。

本种极近镰翅羊耳蒜 *L. bootanensis* Griff., 唯一的不同是本种花较大,萼片长达 1—1.1 厘米,唇瓣宽达 1 厘米,而镰翅羊耳蒜萼片长 3.5—6 毫米,唇瓣宽 2.5—5.5 毫米。G. Seidenfaden (1976) 曾认为还有其他区别,但在我们所看到的标本上未能判明。此两种是否应予合并或降为变种尚有待于进一步的研究。

## 26. 保亭羊耳蒜 (植物分类学报) 图版 12: 5—6

*Liparis bautingensis* T. Tang et F. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **12** (1): 39. 1974; 海南植物志 **4**: 212. 1977; Z. H. Tsi et al. in Acta Phytotax. Sin. **33** (6): 588. 1995.

附生草本。根状茎延长,粗 2—2.5 毫米,具多节,节间长 2—8 毫米,常有残存的膜质鞘;假鳞茎疏生于根状茎上,彼此相距 1.5—4 厘米,近圆柱形或狭卵状圆柱形,长 1—2.5 厘米,宽 3—7 毫米,顶端具 1 叶。叶椭圆形、狭椭圆形或长圆形,坚纸质,长 6—15 厘米,宽 2.2—3.7 厘米,先端渐尖,基部收狭成柄,有关节;叶柄长 1.5—4 厘米。花葶长 7—14 厘米;花序柄扁圆柱形,两侧有狭翅,下部无不育苞片;总状花序通常具 3—4 朵花;花苞片披针形或狭披针形,绿色,长 5—15 毫米;花梗和子房长 1.5—2.2 厘米;花绿色或绿白色;中萼片宽线形或宽线状披针形,长 9—10 毫米,先端钝,边缘外卷;侧萼片近披针形,稍斜歪,略宽于中萼片;花瓣近丝状,长 9—10 毫米,宽约 0.5 毫米;唇瓣近扇状扁圆形或宽倒卵状圆形,长 8—9 毫米,上部宽约 1 厘米,先端近截形并有不规则细齿和位于中央的细尖,基部有 2 枚很小的、基部合生的胼胝体;蕊柱长约 4 毫米,稍向前弯曲,上半部两侧具翅;翅宽约 1 毫米,下弯成钩状。蒴果倒卵形,长约 1.4 厘米,宽 7—9 毫米;果梗长 1.2—1.8 厘米。花期 11 月至次年 2 月,果期 1—4 月。

产海南(保亭吊罗山)和云南东南部(麻栗坡)。生于林中岩石上,海拔 1600 米以下。模式标本采自海南保亭。

## 27. 贵州羊耳蒜 (新拟)

*Liparis esquirolii* Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. **12**: 108. 1913, et in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 197. 1919; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **27** (3, 4): 420. 1974; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **31** (1): 58. fig. 34. 1976.



图版 12 1—2. 柄叶羊耳蒜 *Liparis petiolata* (D. Don) P. F. Hunt: 1. 植株, 2. 唇瓣。3—4. 圆唇羊耳蒜 *L. balansae* Gagnep.: 3. 植株, 4. 唇瓣。5—6. 保亭羊耳蒜 *L. bautingensis* T. Tang et F. T. Wang: 5. 植株, 6. 唇瓣。(蔡淑琴绘)