

毫米，稍向前弯曲，顶端扩大，有宽阔的药床。蒴果近椭圆形，长3—4毫米，宽约3毫米；果梗长4—5毫米。花期6—10月，果期10—11月。

产台湾北部至东南部（台北、苗栗、花莲、台东）、海南（保亭、陵水、琼中）和云南西北部至东南部（贡山、漾濞、富宁、西畴、屏边、景洪、勐海）。生于林中或荫蔽处的树上、岩壁上或岩石上，海拔500—2400米。广泛分布于自非洲至亚洲和太平洋的热带地区。模式标本采自毛里求斯。

本种过去常用 *Liparis caespitosa*，应予更正为 *Liparis cespitosa*。

29. 长苞羊耳蒜（中国高等植物图鉴） 图版14：1—2

Liparis inaperta Finet in Bull. Soc. Bot. France **55**: 341. pl. 11 (fig. 23—25.). 1908; Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 198. 1919; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **27** (3, 4): 422. 1974; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **31** (1): 84. fig. 56. 1976; 中国高等植物图鉴 **5**: 676. 图 8182. 1976; 浙江植物志 **7**: 495. 图 7—662. 1993; 福建植物志 **6**: 632. 1995.

附生草本，较小。假鳞茎稍密集，卵形，长4—7毫米，直径3—5毫米，顶端具1叶。叶倒披针状长圆形至近长圆形，纸质，长2—7厘米，宽6—13毫米，先端渐尖，基部收狭成柄，有关节；叶柄长7—15毫米。花葶长4—8厘米；花序柄稍压扁，两侧具很狭的翅，下部无不育苞片；总状花序具数朵花；花苞片狭披针形，长3—5毫米，在花序基部的长可达7毫米；花梗和子房长4—7毫米；花淡绿色，早期常呈管状，因中萼片两侧与侧萼片靠合所致，但后期分离；中萼片近长圆形，长约4.5毫米，宽1.2毫米，先端钝；侧萼片近卵状长圆形，斜歪，较中萼片略短而宽；花瓣狭线形，多少呈镰刀状，长3.5—4毫米，宽约0.6毫米，先端钝圆；唇瓣近长圆形，向基部略收狭，长3.5—4毫米，上部宽1.5—2毫米，先端近截形并具不规则细齿，近中央有细尖，无胼胝体或褶片；蕊柱长2.5—3毫米，稍向前弯曲，上部有翅；翅近三角形，宽达0.8毫米，多少向下延伸而略呈钩状；药帽前端有短尖。蒴果倒卵形，长5—6毫米，宽4—5毫米；果梗长4—5毫米。花期9—10月，果期次年5—6月。

产浙江、江西、福建、广西中部至北部，四川西南部和贵州中部至东部。生于林下或山谷水旁的岩石上，海拔500—1100米。模式标本采自贵州。

30. 广东羊耳蒜（新拟） 图版15：6—7

Liparis kwangtungensis Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. **19**: 379. 1924; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **27** (3, 4): 422. 1974; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **31** (1): 53. 1976.

附生草本，较矮小。假鳞茎近卵形或卵圆形，长5—7毫米，直径3—5毫米，顶端具1叶。叶近椭圆形或长圆形，纸质，长2—5厘米，宽7—11毫米，先端渐尖，基部收狭成明显的柄，有关节。花葶长3—5.5厘米；花序柄略压扁，两侧具很狭的翅，下



图版 14 1—2. 长苞羊耳蒜 *Liparis inaperta* Finet : 3. 带果植株, 4. 蒴果。3—4. 小巧羊耳蒜 *L. delicatula* Hook. f. : 3. 植株, 4. 花。5—6. 扇唇羊耳蒜 *L. stricklandiana* Rehb. f. : 5. 植株, 6. 花。(冀朝祯绘)