

部无不育苞片；总状花序长1.5—2.5厘米，具数朵花；花苞片狭披针形，长3—4毫米；花梗和子房长3—4毫米；花绿黄色，很小；萼片宽线形，长4—4.5毫米，宽1—1.2毫米，先端钝；侧萼片比中萼片略短而宽；花瓣狭线形，长3.5—4毫米，宽约0.5毫米；唇瓣倒卵状长圆形，长4—4.5毫米，上部宽约2毫米，先端近截形并具不规则细齿，中央有短尖，基部具1个胼胝体，较少胼胝体仅略肥厚而不甚明显；蕊柱长2.5—3毫米，稍向前弯曲，上部具翅；翅近披针状三角形，宽约0.7毫米，多少下弯而略呈钩状。蒴果倒卵形，长4—5毫米，宽3—4毫米；果梗长3—4毫米。花期10月，果期不详。

产福建西部（连城）和广东南部至东部（罗浮山、梅县）。生于林下或溪谷旁岩石上，海拔不详。模式标本采自广东罗浮山。

31. 平卧羊耳蒜（横断山区维管植物） 圆翅羊耳蒜（中国高等植物图鉴）

Liparis chapaensis Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France **79**: 166. 1932, et in Lecomte, Fl. Génér. Indo-Chine **6**: 186. 1932; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **31** (1): 58. fig. 35. 1976, et Opera Bot. **114**: 138. 1972; Averyanov, Iden, Guide Vietnam. Orch. 146. 1994; 横断山区维管植物 **2**: 2568. 1994.

附生草本，较小。假鳞茎密集，多少平卧，近卵状长圆形，长4—6（—15）毫米，直径5—10毫米，顶端具1叶。叶狭椭圆形至长圆形，纸质或薄革质，长3—5（—10）厘米，宽8—11毫米，先端渐尖，基部收狭成明显的柄，有关节。花葶长4—7厘米；花序柄扁圆柱形，两侧具狭翅，下部无不育苞片；总状花序长2—4厘米，疏生数朵花；花苞片狭披针形，长4—5毫米；花梗和子房长8—10毫米；花淡黄绿色或变为橘黄色，但蕊柱白色；中萼片近狭长圆状披针形，长4—6（—9）毫米，宽1.5—2毫米，先端渐尖，边缘外卷，具3脉；侧萼片狭长圆状披针形，稍斜歪，略宽于中萼片；花瓣狭线形，长约4毫米，宽约0.5毫米；唇瓣近倒卵状长圆形，长约4毫米，上部宽约3毫米，先端近截形并在中央具短尖，近基部具1个2裂的胼胝体；蕊柱长约3毫米，稍向前弯曲，上部具狭翅。花期10月。

产广西西部（天峨）、贵州西南部（兴义）和云南西北部（贡山）。生于石灰岩山坡常绿阔叶树林中的树上或岩石上，海拔800—2000米。越南、缅甸也有分布。模式标本采自越南。

32. 小羊耳蒜（中国高等植物图鉴） 石米（秦岭植物志） 图版15: 3—5

Liparis fargesii Finet in Bull. Soc. Bot. France **55**: 340. pl. 11 (fig. 13—22). 1908; Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 197. 1919; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **27** (3, 4): 420. 1974; 秦岭植物志 **1** (1): 423. 图414. 1976; 中国高等植物图鉴 **5**: 675. 图8180. 1976; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **31** (1): 61. fig. 37. 1976; K. Y. Lang et Z. H. Tsi in Bot. Res. Inst. Bot. **6**: 66. 1992; 横