

断山区维管植物 2: 2569. 1994.

附生草本，很小，常成丛生长。假鳞茎近圆柱形，长 7—14 毫米，直径约 3 毫米，平卧，新假鳞茎发自老假鳞茎近顶端的下方，彼此相连接而匍匐于岩石上，顶端具 1 叶。叶椭圆形或长圆形，坚纸质，长 1—2 (—3) 厘米，宽 5—8 毫米，先端浑圆或钝，基部骤然收狭成柄，有关节；叶柄长 3—6 毫米。花葶长 2—4 厘米；花序柄扁圆柱形，两侧具狭翅，下部无不育苞片；总状花序长 1—2 厘米，通常具 2—3 朵花；花苞片很小，狭披针形，长 1—1.8 毫米；花梗和子房长 8—9 毫米；花淡绿色；萼片线状披针形，长 5—6 毫米，宽 1.2—1.4 毫米，先端钝，边缘常外卷，具 1 脉；花瓣狭线形，长 5—6 毫米，宽约 0.3 毫米；唇瓣近长圆形，中部略缢缩而呈提琴形，长 4—5 毫米，上部宽 2.5—3 毫米，先端近截形并微凹，凹缺中央有时有细尖，基部无胼胝体但略增厚；蕊柱长 3—3.5 毫米，稍向前弯曲，上端有狭翅。蒴果倒卵形，长 6—7 毫米，宽 3—4 毫米；果梗长 6—7 毫米。花期 9—10 月，果期次年 5—6 月。

产陕西南部、甘肃南部（武都）、湖北西部、湖南（桑植、永顺）、四川西部至北部、贵州和云南（昆明）。生于林中或荫蔽处的石壁或岩石上，海拔 300—1400 米。模式标本采自四川城口。

33. 宽叶羊耳蒜（新拟）

Liparis latifolia (Bl.) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 30. 1830; Merrill et Metc. in Lingn. Sci. J. 21: 11. 1945; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. 27 (3, 4): 423. 1974; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. 31 (1): 54. fig. 31. 1976. —*Malaxis latifolia* Bl., Bijdr. 339. 1825.

附生草本。假鳞茎稍密集，近圆柱形，向上渐狭，长可达 8 厘米，宽 1.5—3 厘米，外被红棕色鞘，顶端具 1 叶。叶近椭圆形或椭圆状长圆形，长达 20 厘米以上，宽 5 厘米以上，先端近渐尖，基部收狭成柄，有关节。花葶与叶近等长；总状花序具多朵花；花苞片短小；花梗和子房长约 1.5 厘米；花淡黄色，具桔褐色唇瓣；萼片近长圆形，长约 8 毫米，宽约 3 毫米，先端急尖或钝；花瓣狭线形，长约 8 毫米，宽约 1 毫米；唇瓣近倒卵状长圆形，长约 1 厘米，基部宽约 3 毫米，先端 2 深裂，基部有 1 个 2 裂的胼胝体；先端裂片叉开，近长圆形，长 4—5 毫米，宽 2.5—3 毫米，先端有不规则细齿；蕊柱长 3—3.5 毫米，上端有狭翅。花期不详。

产海南南端（三亚）。泰国、马来西亚、印度尼西亚和新几内亚岛也有分布。模式标本采自马来西亚。

本种系由 E. D. Merrill and F. P. Metcalf (1945) 根据侯宽昭 71022 标本鉴定的。此标本我们未曾看到，难以判断。上面描述摘自有关文献。

34. 三裂羊耳蒜（新拟）

Liparis mannii Rehb. f. in Flora 55: 275. 1872; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 5: