

此，留待后人研究。

37. 细茎羊耳蒜（新拟）

Liparis condylobulbon Rchb. f., Hamb. Gartenz. **18**: 34. 1862; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **31** (1): 70. fig. 44. 1976; 台湾兰科植物 **2**: 217—219 (图). 1977. 台湾兰科植物彩色图鉴 **2**: 241, 258. 图 25. 1990. ——*Leptorchis condylobulbon* (Rchb. f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 671. 1891. ——*Liparis confusa* J. J. Smith, Fl. Buitenz. **6**: 275. fig. 211. 1905. ——*Liparis dolichopoda* Hayata, Icon. Pl. Formos. **4**: 27. pl. 5. 1914; 台湾植物志 **5**: 1041. 1978. ——*Cestichis dolichopoda* Hayata, 1. c. ——*Liparis longipes* auct. non Lindl.: Matsumura et Hayata, Enum. Pl. Formos. 407. 1906.

附生草本。根状茎较长，直径约2.5毫米，疏生假鳞茎（彼此相距2—4厘米）；假鳞茎圆柱形，基部较粗，向上渐细，长6—12厘米，直径5—8毫米，绿色，有光泽，顶端具2叶。叶披针形或倒披针状线形，长10—15厘米，宽1—1.5厘米，先端钝或急尖，基部收狭成短柄，有关节。花葶长约10厘米；总状花序密生数十朵小花；花苞片披针形，长约3毫米；花梗和子房长约5毫米；花淡绿色或近黄白色；萼片长圆形，长约3.5毫米，宽约1.5毫米，先端钝；花瓣线形，长约3.5毫米，宽约0.5毫米，先端钝；唇瓣倒卵形，长约3毫米，宽约2毫米，先端不甚明显的2裂；蕊柱长约2毫米。花期9—11月。

产台湾南北（台北、台东、屏东、花莲和恒春半岛）。生于干燥而透光处的岩石上或树上，海拔多在200—300米间，也可上升至500—1800米。泰国、印度尼西亚、菲律宾、新几内亚岛也有分布。模式标本采自印度尼西亚爪哇。

台湾标本未看到，上面描述摘自原记载和所引证文献。

38. 折唇羊耳蒜（西藏植物志） 图版16: 3—5

Liparis bistriata Par. et Rchb. f. in Trans. Linn. Soc. **30**: 155. 1874; Hook. f. in Hook. Icon. Pl. **19**: t. 1858. 1889; King et Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calcutta **8**: 30. pl. 39. 1898; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **31** (1): 73. fig. 47. 1976; 西藏植物志 **5**: 847. 图 467 (3—5). 1987; 横断山区维管植物 **2**: 2570. 1994. ——*Liparis saltucola* Kerr in Kew Bull. 216. 1927.

附生草本。假鳞茎密集，圆柱形，长9—12厘米，直径5—7毫米，顶端具2叶。叶近椭圆形或椭圆状披针形，近革质，长6.5—9厘米，宽2.6—3.4厘米，先端渐尖，基部收狭成短柄，有关节。花葶长18—24厘米；花序柄近圆柱形，几无翅，下部无不育苞片；总状花序具20余朵花；花苞片披针形，长3—4毫米；花梗和子房长约1厘米；花淡绿色；萼片近狭长圆形，长5—5.5毫米，宽约1.5毫米，先端钝，边缘外卷，具3脉；花瓣线形，长4.5—5毫米，宽约0.5毫米，先端钝，具1脉；唇瓣近长圆形，