

形，长4.5—5.5毫米，宽约2.5毫米，先端钝；花瓣狭线形或近丝状，长4.5—5.5毫米，宽约0.7毫米，具1脉；唇瓣近长圆形，向基部略收狭，长6—7毫米，宽3—5毫米，近下部1/3处骤然向外折，近基部有2个不明显的胼胝体，先端2深裂；裂片近长圆形，长1.5—2毫米，宽约1.5毫米，前面边缘常有不规则缺刻；蕊柱长约4毫米，稍向前弯曲，绿色。花期10—11月。

产台湾南部至东部（屏东、兰屿、花莲、宜兰）。生于常绿阔叶树林中的树干上或巨枝上。缅甸和菲律宾也有分布。模式标本采自缅甸。

我们未看到台湾标本。上面描述摘自《台湾兰科植物》（1977）和《台湾植物志》（1978）。

#### 45. 裂唇羊耳蒜（中国高等植物图鉴）

*Liparis fissilabris* T. Tang et F. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **12** (1): 1974; 海南植物志 **4**: 214. 1977.

附生草本。假鳞茎密集，卵形至卵状长圆形，长1.5—3.5厘米，直径1—1.8厘米，顶端或近顶端具2叶。叶倒披针状长圆形、舌状长圆形或狭椭圆状长圆形，纸质，长6—19厘米，宽1.8—3.2厘米，先端渐尖或急尖，基部逐渐收狭成柄，有关节。花葶长12—18厘米；花序柄近无翅，靠近花序下方有数枚白色的、薄膜质的不育苞片；总状花序具10—30朵花；花苞片线状披针形，白色，薄膜质，长3—5毫米；花梗和子房长5—10毫米；花绿色，但具红色唇瓣，疏离；萼片近长圆形，长3.5—4毫米，宽约1.3毫米，先端钝，具3脉；花瓣丝状，长3.5—4毫米，具1脉；唇瓣近匙状长圆形，长4—5毫米，上部宽约1.7毫米，下部1/3—2/5处有皱褶，边缘多少有缘毛，从基部至中部有2条纵褶片，先端2裂并在裂口中央具短尖；裂片卵形或长圆形，长约1.2毫米，宽约1毫米，先端有时有不规则缺刻，外缘多少有缘毛；蕊柱长2—2.5毫米，近直立或顶端稍向前弯曲，顶端有狭翅，基部宽阔。蒴果倒卵状椭圆形，长7—8毫米，宽4—5毫米；果梗长7—8毫米。花期11月，果期1—2月。

产海南（保亭、陵水）。生于林中或溪边树上或岩石上，海拔500米。模式标本采自海南保亭。

#### 46. 黄花羊耳蒜（中国高等植物图鉴）

*Liparis luteola* Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. **32**. 1830; Hook. f., Fl. Brit. Ind. **5**: 704. 1890; Merrill et Metc. in Lingn. Sci. J. **21**: 11. 1945; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **27** (3, 4): 423. 1974; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **31** (1): 78. fig. 52. 1976; 中国高等植物图鉴 **5**: 677. 图 8184. 1976; 海南植物志 **4**: 213. 1977.

附生草本，较矮小。假鳞茎稍密集，常多少斜卧，近卵形，长6—7毫米，宽4—5毫米，顶端具2叶。叶线形或线状倒披针形，纸质，长（4—）6—14厘米，宽4—9毫