

米，先端渐尖，基部逐渐收狭成柄，有关节；叶柄长1—1.5厘米。花葶长6—16厘米；花序柄略压扁，两侧有狭翅，靠近花序下方有时有1枚不育苞片；总状花序长3—6厘米，具数朵至10余朵花；花苞片披针形，长3—4毫米，在花序基部的可达5—6毫米；花梗和子房长9—14毫米；花乳白绿色或黄绿色；萼片披针状线形或线形，长约4毫米，宽约1毫米，先端钝，中脉在背面稍隆起；侧萼片通常略宽于中萼片；花瓣丝状，长约4毫米，宽约0.3毫米；唇瓣长宽长圆状倒卵形，长约3.5毫米，上部宽约2.8毫米，先端微缺并在中央具细尖，近基部有一肥厚的纵脊，脊的前端有1个2裂的胼胝体；蕊柱纤细，长约2.5毫米，稍向前弯曲，上部具翅。蒴果倒卵形，长7—9毫米，宽3—4毫米；果梗长6—9毫米。 花果期12月至次年2月。

产海南（保亭、昌江、定安）。生于林中树上或岩石上。印度、缅甸和泰国也有分布。模式标本采自印度阿萨姆。

47. 小巧羊耳蒜（中国高等植物图鉴） 图版14：3—4

Liparis delicatula Hook. f. in Hook. Icon. Pl. **19**: t. 1889. 1889, et Fl. Brit. Ind. **5**: 705. 1890; King et Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calcutta **8**: 35. pl. 46. 1898; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **31** (1): 93. fig. 63. 1976, et Opera Bot. **114**: 145. 1994; 海南植物志 **4**: 213. 1977; 横断山区维管植物 **2**: 2570. 1994; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 294. 1995. ——*Liparis aurita* auct. non Ridl.; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 294. 1995.

附生草本，很小，近丛生。假鳞茎密集，长圆形或近圆柱状梭形，长5—9毫米，直径3—5毫米，顶端或近顶端处具2（—3）枚叶。叶匙状长圆形至长圆状披针形，纸质，长1.2—3.5（—4.5）厘米，宽5—11毫米，先端急尖并具短尖，基部收狭成短柄，有关节。花葶长4—10厘米，上部有时具狭翅，靠近花序下方具少数不育苞片；总状花序长2—5厘米，具数朵至10余朵花；花苞片卵状披针形，长2—3毫米；花梗和子房长3—4毫米；花白色；中萼片卵状长圆形，长2.5—3毫米，宽1.5—1.8毫米，先端钝，背面有龙骨状突起；侧萼片卵形或卵状椭圆形，稍斜歪，宽约2毫米，背面无龙骨状突起；花瓣狭线披针形，长2.5—3毫米，宽约0.5毫米；唇瓣宽椭圆形或近圆形，长约2.5毫米，先端近截形或浑圆并有短尾，中部以下两侧明显皱缩并扭曲，使上部强烈外折，基部两侧各有1个圆形的耳状皱褶，貌似胼胝体，近基部中央有1个中央凹陷的胼胝体；蕊柱长约2.2毫米，直立，前面上部有2翅，两侧下部又有2翅。蒴果三棱状倒卵形，长约4毫米，宽约2.5毫米；果梗长约2毫米。 花期10月，果期次年1月。

产海南（保亭、陵水）、云南西部至南部（泸水、腾冲、景洪、勐腊）和西藏东南部（墨脱）。生于山坡或河谷林中树上，海拔500—2900米。锡金、印度和老挝也有分布。模式标本采自印度阿萨姆。



图版 14 1—2. 长苞羊耳蒜 *Liparis inaperta* Finet : 3. 带果植株, 4. 蒴果。3—4. 小巧羊耳蒜 *L. delicatula* Hook. f. : 3. 植株, 4. 花。5—6. 扇唇羊耳蒜 *L. stricklandiana* Rehb. f. : 5. 植株, 6. 花。(冀朝祯绘)