

5 毫米；花黄色；中萼片长圆状披针形，长2.5—3.5 毫米，先端急尖，具1 脉；侧萼片近长圆形或卵状长圆形，内缘从中部以下合生成合萼片；合萼片卵状长圆形，较中萼片短而宽；花瓣狭线形，长约4 毫米，先端2 深裂；裂片略叉开，长0.7—1 毫米；唇瓣全长1.5—2 毫米，由前唇与爪组成；前唇长圆形，先端微凹，基部两侧有耳；爪宽线形，长0.5—0.8 毫米，与前唇连接处有1 个横向的和1 个斜向的褶片状胼胝体；蕊柱直立，长约1.5 毫米，上部两侧有近钝三角形的宽翅。蒴果球形或宽椭圆形，长3—4 毫米；果梗长3—4 毫米。 花期9 月。

产四川东北部（城口）。生于林中树上，海拔1 200 米。（模式标本产地）。

未 详 知 种

52. 管花羊耳蒜

Liparis seidenfadeniana Szlach. in Novon **3** (3): 303. fig. 1. 1993.

附生草本。假鳞茎圆柱形，长约10 毫米，宽2 毫米，顶端具1 叶。叶倒卵形，长一般不到1 厘米，最长可达2.5 厘米，宽5—8 毫米，先端钝。花葶长约1.5 厘米；总状花序具1—2（—3）朵花；花苞片卵状三角形，膜质，长约3 毫米；花梗和子房长3—4 毫米；花小，管状；中萼片长圆状卵形，长约4.5 毫米，宽约1.5 毫米，边缘约2/3 与侧萼片合生；侧萼片长圆状披针形，长4.5 毫米，宽1.3 毫米，两侧萼片之间分离；花瓣线形，与萼片等长，宽约0.5 毫米；唇瓣近长圆形，肉质，长4.5 毫米，宽2.5—2.8 毫米，基部略有小耳，边缘和中脉增厚，先端微凹；蕊柱稍向前弯曲，无翅。 花期不详。

产四川、贵州。生境不详。

根据原描述和图，此种十分接近小羊耳蒜 *Liparis fargesii* Finet。主要的区别是后者中萼片与侧萼片离生，而本种则合生达2/3。但是，长苞羊耳蒜 *L. inaperta* Finet 在花幼嫩时，亦呈管状，中萼片与侧萼片也貌似合生，但后期就分离了。因此，此种特征是否可靠，值得进一步的研究。

70. 沼兰属 *Malaxis* Soland. ex Sw.

Soland. ex Sw., Prodr. 8, 119. Jul. 1788; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. **3**: 493. 1883; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **33** (1): 42. 1978. —*Microstylis* Nutt., Gen. North Amer. Pl. **2**: 196. 1818. —*Anaphora* Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris sér. 2, **4**: 592. 1932.