

11 月?

产广西 (环江、南丹)。生于石灰岩山顶疏林中石上, 海拔 650—850 米。越南、泰国也有分布。模式标本采自广西。《横断山区维管植物》记载本种也产云南, 实应为狭叶鸢尾兰 *O. caulescens*。

19. 中华鸢尾兰 (植物分类学报) 图版 22: 4—7

Oberonia cathayana W. Y. Chun et T. Tang ex S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **20** (2): 192. fig. 1 (4—7). 1982.

植株较小, 具短茎。叶近基生, 3—4 枚, 二列套叠, 两侧压扁, 肥厚, 近剑形, 长 1—3.5 厘米, 宽 2.5—5 毫米, 先端渐尖, 下部内侧具干膜质边缘, 脉不明显, 基部有关节。花葶从叶丛中央抽出, 长 4—6 厘米, 近圆柱形, 无翅, 在花序下方有多枚不育苞片; 不育苞片膜质, 卵状披针形或狭卵形, 长 1.2—1.6 毫米; 总状花序长 2.5—4 厘米, 直径 2—2.5 毫米, 密生百余朵花; 花序轴具许多凹陷的小凹穴, 花着生于小凹穴中; 花苞片卵状椭圆形, 长约 1 毫米, 上部边缘有不规则的细缺刻; 花梗和子房长约 0.5 毫米; 花很小, 直径约 1 毫米; 中萼片宽椭圆状卵形, 长约 0.5 毫米, 宽约 0.5 毫米, 先端浑圆; 侧萼片卵形, 长约 0.6 毫米, 宽约 0.3 毫米, 先端近急尖; 花瓣近长圆形, 长约 0.4 毫米, 宽约 0.15 毫米; 唇瓣轮廓为宽长圆状卵形, 长 0.8—1 毫米, 3 裂; 侧裂片位于唇瓣基部两侧, 方形或长圆形, 边缘略有啮蚀状缺刻; 中裂片近倒卵状方形, 先端 2 裂; 先端小裂片近方形或宽卵形, 上面有银白色细斑点, 边缘稍有啮蚀状缺刻; 蕊柱粗短。花期不详。


产广西, 具体产地与生境不详。(模式标本产地)

G. Seidenfaden (1968) 曾将本种的等模式标本 (高锡朋 55774, 藏美国 O. Ames 标本室) 鉴定为 *Oberonia recurva* Lindl. (未完全肯定)。诚然, 该种的唇瓣颇似本种, 但叶基部不具关节, 果梗较长, 很容易区别于本种。

20. 鸢尾兰 (植物分类学报) 图版 23: 7

Oberonia iridifolia Roxb. ex Lindl. (ex Wall. Cat. no. 1948. 1829, nom. nud.), Gen. Sp. Orch. Pl. 15. 1830; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **25** (3): 42. fig. 23. 1968, et **33** (1): 16. fig. 7. 1978; Averyanov, Iden. Guide Vietnam. Orch. 160. 1994; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 294. 1995. —*Cymbidium iridifolium* Roxb. (Hort. Bengal 63. 1814, nom. nud.), Fl. Ind. ed. 2, **3**: 458. 1832. —*Malaxis iridifolia* (Roxb. ex Lindl.) Rchb. f. in Walp. Ann. **6**: 208. 1861. —*Iridorchis iridifolia* (Roxb. ex Lindl.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 669. 1891.

茎短, 不明显。叶近基生, 5—6 枚, 二列套叠, 两侧压扁, 肥厚, 长 6—16 厘米, 宽 6—15 毫米, 先端短渐尖或钝, 干后脉明显可见, 下部内侧有干膜质边缘, 基部有关



图版 22 1—3. 勐海鳶尾兰 *Oberonia menghaiensis* S. C. Chen: 1. 植株, 2. 花序的一部分, 3. 花。4—7. 中华鳶尾兰 *O. cathayana* W. Y. Chun et T. Tang ex S. C. Chen: 4. 植株, 5. 花序的一部分, 6. 花, 7. 唇瓣。8. 绿春鳶尾兰 *O. acaulis* Griff. var. *luchunensis* S. C. Chen: 花。(冀朝棣绘)