

3 毫米；总状花序下垂，圆柱形，长 4—6 厘米，直径 3—3.5 毫米，具密集的小花；花苞片披针形，膜质，长 2.5—3 毫米，先端长渐尖，边缘有不规则的齿裂；花梗和子房长 0.5—0.8 毫米；花白色或绿白色，仅唇瓣与蕊柱常略带浅黄褐色；萼片近椭圆形或长圆状卵形，长 1—1.3 毫米，宽约 0.7 毫米，先端钝，背面近先端处常有刺毛状突起，脉不明显；侧萼片常略宽于中萼片；花瓣狭长圆形，与萼片近等长，宽约 0.2 毫米，先端钝，背面近先端处亦具刺毛状小突起；唇瓣近长圆形，长 1—1.3 毫米，不明显 3 裂；侧裂片边缘有数个不规则的流苏状裂条；中裂片边缘也有数条不规则的流苏状裂条；中央的裂条长可达 1 毫米以上，两侧的较短；蕊柱粗短。蒴果近椭圆形，长约 4 毫米，宽 2.5—3 毫米；果梗很短，长不到 0.5 毫米。花期果 8—10 月。

产贵州南部至西南部（惠水、兴义）、广西西部（凌云）、云南南部至东南部（思茅、建水、勐海、勐腊、砚山）。生于林下或灌丛中的树木枝条上，海拔 1200—1500 米。尼泊尔、印度、缅甸、泰国也有分布。模式标本采自尼泊尔。

## 72. 套叶兰属 *Hippeophyllum* Schltr.

Schltr. in K. M. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Deutsch.

Schutzgeb. Suedsee 107. Nov. 1905.

附生草本，具长的横走根状茎，根状茎上以一定的距离着生叶簇。茎很短，包藏于叶基之内。叶数枚，着生于短茎上，二列，两侧压扁，肉质，基部彼此套叠，具或不具关节。花序从叶丛中央抽出；总状花序密生或近密生多花；花苞片很小；花不扭转，很小；萼片与花瓣离生，展开；花瓣比萼片狭小或近等大，常外弯或反卷；唇瓣比萼片大，通常 3 裂，较少为先端 2 裂，基部凹陷，无距，边缘有时有齿或呈啮蚀状；蕊柱短或中等长；花药顶生；花粉团 4 个，成 2 对，蜡质，无花粉团柄，基部略有粘性物质；柱头凹陷，位于蕊柱前上方。

本属模式种：*Hippeophyllum micranthum* Schltr.

全属约 6 种，产马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新几内亚岛、所罗门群岛，向北可到我国亚热带地区。我国有 2 种。

## 分种检索表

1. 叶椭圆形或椭圆状披针形，宽约 8 毫米，基部无关节 .....  
..... 1. 宝岛套叶兰 *H. pumilum* Fukuyama ex Masamune et T. P. Lin
1. 叶剑形或狭长圆状披针形，宽 1.5—2 毫米，基部具关节 .....  
..... 2. 套叶兰 *H. sinicum* S. C. Chen et K. Y. Lang