

假鳞茎长圆状卵球形至近方形，长达2厘米，宽1厘米。叶1枚，生于假鳞茎顶端，披针形，长可达30厘米，宽约1.7厘米，具明显的脉；叶柄长达10厘米。花葶从假鳞茎侧面发出，长达35厘米，中下部有2枚筒状鞘；总状花序具约20朵花；花苞片披针形，长约5毫米；花梗和子房长约1.2厘米；花大，张开，直径达1.5厘米，棕绿色或黄绿色，但唇瓣淡粉红色至白色并有紫色斑点；中萼片线状披针形，长1.5—1.6厘米，宽约3毫米，先端近急尖；侧萼片宽披针形，长约12毫米，宽3毫米；花瓣长圆状披针形，长约13毫米，宽约3毫米，先端钝；唇瓣长达11.6毫米，3裂，基部有长爪；侧裂片长圆形，长约4.2毫米，宽1.2毫米，稍内弯，先端钝；中裂片卵状椭圆形，长为唇瓣的3/5，宽约6毫米，边缘波状；唇盘上有2条半月形的纵褶片，位于两枚侧裂片之间和中裂片基部上方，长达2.6毫米，高约1毫米；蕊柱长达8.3毫米。花期5—6月。

产西藏南部（朗县）。生境不详。尼泊尔也有分布。模式标本采自尼泊尔。

未看到标本，上面描述摘自新种原记载。

9. 囊唇山兰（新拟）

Oreorchis indica (Lindl.) Hook. f., Fl. Brit. Ind. **5**: 709. 1890; Finet in Bull. Soc. Bot. France **44**: 70. 1897. — *Corallorhiza indica* Lindl. in J. Proc. Linn. Soc. Bot. **3**: 26. 1859. — *Oreorchis foliosa* (Lindl.) Lindl. var. *indica* (Lindl.) N. Pearce et Cribb in Edinb. J. Bot. **54** (3): 307. fig. 8. 1997.

假鳞茎卵球形或近椭圆形，长7—10毫米，宽5—7毫米，具2—3节，多少被撕裂成纤维状的鞘。叶1枚，生于假鳞茎顶端，狭椭圆形或狭椭圆状披针形，长12—13厘米，宽约2.4厘米，基部具短柄；叶柄长2—2.5厘米。花葶从假鳞茎侧面发出，直立，长20—36厘米，中下部有2—3枚筒状鞘；总状花序长5—9.5厘米，具4—9朵花；花苞片长圆状披针形，长2—3毫米；花梗和子房长5—7毫米；花直径约1.5厘米；萼片与花瓣暗黄色而有大量紫褐色脉纹和斑，唇瓣白色而有紫红色斑；萼片狭长圆形，长8—9毫米，宽1—1.5毫米，先端急尖；侧萼片略斜歪；花瓣狭卵形或狭卵状披针形，长6—7毫米，下部宽约2毫米，先端渐尖；唇瓣轮廓为倒卵状长圆形或宽长圆形，长6—7毫米，宽约4毫米，在中部至上部1/3处略3裂或仅两侧有裂缺，基部具爪并有明显的囊状短距，上半部（或中裂片）边缘波状，先端多少有不规则缺刻，唇盘上无褶片；蕊柱细长，长5—6毫米，基部肥厚并略扩大。花期6月。

产四川西南部（康定）、云南西北部和西藏南部（朗县、亚东）。生于林下或高山草甸上，海拔2500—3400米。尼泊尔、不丹、锡金和印度北部也有分布。模式标本采自印度西姆拉。

10. 大霸山兰（中山自然科学大辞典）

Oreorchis bilamellata Fukuyama in Bot. Mag. Tokyo **48**: 436. 1934; S. Y. Hu in